

讨 论

冠心病、脑血栓、静脉炎等疾病与血液高凝倾向有一定关系,本文从此观点出发,对九种中药进行了抗血栓形成的研究。结果表明,九种中药对血栓形成

各阶段有不同程度的抑制作用,特别是木通、羌活、苏木、炙甘草对血小板聚集等七个指标均有显著抑制作用。提示这些中药对于改善血液高凝倾向,抑制血栓形成有一定意义,也为用这些中药治疗冠心病,脑血栓、静脉炎等疾患提供了理论根据。

参 考 文 献

1. 中医研究院西苑医院生化研究室等:活血化瘀药物对大鼠体外血栓形成的影响。新医药杂志 8, 64, 1978
2. Gardner RA: An examination of the fluid mechanics and thrombus formation time parameters in a Chandler rotating loop system. J of Lab and Clin Med 84:494, 1974
3. Silver MJ: Platelet aggregation and platelet formation: A model test system. Am J Physiol 218:384, 1970

养血补肾汤治疗月经失调(摘要)

北京西苑医院妇科功血组

赵树仪(指导) 刘熙政 蔡莲香 秦国兰

我们根据祖国医学认为肾气盛,天癸充,冲任通盛,血海满盈,下注胞宫,则月经才能正常的理论,拟养血补肾汤治疗闭经、稀发月经及功能失调性子宫出血 28 例,获满意疗效,现报告如下:

一、临床资料:全部病例均为经内分泌检查确诊的门诊病人,其中继发闭经 5 例、稀发月经 9 例、无排卵性功血 14 例。青春期 8 例,生育期 20 例。未婚 23 例、已婚 5 例。初潮起失调者 20 例、过劳及其它因素各 4 例。病程多在 3 年以上。中医辨证:肾虚 8 例、脾肾虚 19 例、脾虚 1 例。

二、养血补肾汤的组成和用法:当归 15g 川芎 10g 鸡血藤 12g 丹参 15g 炙芪 15g 甘草 10g 菟丝子 15g 复盆子 15g 菟藟子 15g 紫河车 15g 木香 6g 熟地 10g 阴虚明显者加女贞子、旱莲草;阳虚明显者加巴戟天、仙灵脾、附子、肉桂;脾虚明显者加党参、茯苓、白术;兼瘀者加生蒲黄、五灵脂;月经周期过短者去当归、川芎、丹参、鸡血藤。汤剂每周 4~6 剂,丸药每日 20~40g。

三、疗效标准:痊愈:稀发月经或闭经者周期缩短至 40 天以内,伴有排卵;功血者周期正常(23~35

天以内)、经期在 7 天以内,出现排卵。显效:稀发月经或闭经者周期缩短至 40 天以内,尚无排卵,或有排卵而月经周期未缩短至 40 天以内;功血者周期恢复正常,经期在 8 天以内。有效:稀发月经、闭经、功血周期及出血期均有好转,但未达到显效标准。无效:周期及出血均无好转。

四、疗效:28 例中痊愈 13 例、显效 7 例、有效 7 例,总有效率 96.43%。其中用本方治疗稀发月经 9 例,痊愈 4 例、显效 2 例、有效 1 例;治疗闭经 5 例,痊愈 2 例、显效 2 例、有效 1 例;治疗功血 14 例,痊愈 7 例、显效 3 例、有效 3 例。

五、体会:祖国医学认为,气血是月经的主要物质基础;而脾胃是气血生化之源;肝为藏血之脏,肝血充盛才能下注冲脉,月经应时而至;肾为先天之本,主藏精,在肾气的使用下,“天癸”逐渐成熟,促使冲任二脉气血通盛,下注胞宫,月经按时来潮。

养血补肾汤具有滋肝肾、健脾胃、益气血之功效,对卵巢有一定功能的闭经、稀发月经患者起到缩短周期,促进排卵的作用,对功血患者具有调整周期和止血功能。病例数较少,有待进一步研究和观察。