

胰腺炎的防治上,争取在十年内形成具有我国特点的中西医结合治疗方法。

4. 对炎性肠病的研究我们重视的还不够,预计这类疾病今后有逐渐增加的可能。首先应改进诊断方法,提高确诊率,其次是研究中西医结合治疗措施。

5. 随着平均寿命的延长,老年急腹症也将增加,除注意常见急腹症在老年人的特殊表现外,还应注意老年人的特殊急腹症的防治研究,在这方面中西医结合疗法也有其优越性,不应忽视。

6. 在理论研究及药物研究上应加快步伐。每五年有一批重点课题,争取到2000年能够阐明急腹症常用八法的作用机理及“六腑以通为用”的原理,能够研制出十种以上有独特疗效的新型中药制剂。

如果上述奋斗目标能够实现,中西医结合治疗急腹症就会大大改观,为发展具有我国特点的中国医药学大放异彩,也将为世界医学的发展做出贡献。

“早搏一方”治疗早搏 199 例疗效观察

河南息县人民医院 李敬芝 姚 峰

从1978年7月~1983年6月我们用中药“早搏一方”治疗199例早搏患者,取得了较好效果,报告如下。

一般资料 199例中,男83例,女116例。年龄12~73岁,40~49岁最多占43%。病程1月~10年不等。早搏类型:房性23例,交界区性32例,室性144例。原发病:高血压并冠心病16例,高血压14例,冠心病97例,心肌炎67例,肺心病5例。87%的病人曾用过心得安、异搏定、大仑丁、奎尼丁等药疗效不佳。

治疗方法 “早搏一方”:葛根60g 全瓜蒌30g 广郁金、泽兰各15g 灵磁石、珍珠母各30g(先煎) 刘寄奴、当归、炙甘草各9g(何文坚等:新医学1978;9(4):179)。每日一剂,早晚两次煎服。皆停用其它抗心律失常药物。

疗程:1个月以内68例,2个月以内47例,3个月以内25例,4个月以内15例,5个月以内17例,6个月以内9例,7~9个月18例。最短13天,最长274天,平均疗程102天。

治疗结果 疗效评定:根据心脏听诊一分钟以上及心电图记录,结合自觉症状,参照全国中西医结合防治冠心病及心律失常研究座谈会所订标准。显效:治疗后早搏及自觉症状消失,54例占27.13%;有效:治疗后早搏较治疗前减少50%以上,或原为频发或成二、三联律减至3~5次/分以下,自觉症状改善,128例占64.32%;无效:治疗后早搏未减少或仅症状稍改善,17例占8.55%。总有效率91.45%。

本方对各类早搏均有效。总有效率:房性91.3%,交界区性90.6%,室性91.66%。各类间疗效统计

学处理,无显著性差异($P>0.05$)。

不同病因所致早搏的总有效率:高血压并冠心病88%,高血压92%,冠心病90.7%,心肌炎95%,无显著性差异。且能缩短心肌炎病程,改善冠心病的缺血性心电图改变。肺心病5例中3例有效,2例无效。

疗效与病程的关系:病程半年以内者总有效率为97.2%,半年~1年者为97.2%,1~5年者为92.5%,5年以上者为60.9%;54例显效者有42例,占77.78%,病程在一年内,病程5年以上者疗效差。

体会 “早搏”与祖国医学的“心悸”、“结、代脉”等证候记载颇相吻合。中医学认为多属于痹证和心阳不振、血脉瘀滞。西医认为其可能与心肌病变、缺氧、电解质紊乱、感染、神经功能失调等因素有关。本组病例均有心悸、头晕、失眠、乏力、胸闷等自觉症状,且曾用抗心律失常西药治疗效果不满意。

“早搏一方”以葛根、瓜蒌、广郁金宣痹通阳,配以当归、泽兰、刘寄奴活血化瘀为主,以灵磁石、珍珠母宁心安神为辅,加炙甘草补益心气、调和诸药起协同和保护胃气的作用。现代药理学研究表明:葛根、当归增加冠脉血流量,降低冠脉阻力及心肌耗氧量,对抗脑垂体后叶素所致缺血缺氧。据报道,当归还有奎尼丁样作用,且能对抗肾上腺素所致的心律失常。广郁金、瓜蒌增加冠脉血流量和心肌收缩力。甘草有抗变态反应等类皮质激素样作用,可降低饲喂胆甾醇饮食的家兔血中胆甾醇及抑制动脉粥样硬化,以利于心肌炎症变性及冠心病的治疗。灵磁石、珍珠母似能抑制心脏异位兴奋灶的兴奋性,而减少或消除早搏发生。综上所述,该方治疗早搏有一定理论基础。