

用于各种有关凝血因素外,可能与其具有一定降脂作用,从而间接加快红细胞电泳率、降低血液粘度及降低血液凝固性有关。本研究的结果提示,熟三七对血脂的影响与生三七有一定差别,其药理作用也可能发生改变。有报道^[1],三七粉经高压消毒后则失去止血作用;还有记载^[2],三七熟食有生血、补血之功效。上述改变的机理以及它们与血脂改变的关系,值得进一步研究。

三七冠心宁不论是否经高温处理均有一定抑制大白鼠实验性高脂血症血清胆固醇升高作用,但该作用只在未经高温处理造模半月时显著,至造模一月即不再存在;用于实验性高胆固醇血症的治疗,也未见其降脂作用。因此,我们认为,三七冠心宁可能有轻度降脂作用,但远非理想的降脂药。

参 考 文 献

1. 李时珍,《本草纲目》,第2册,第1版,北京:人民卫生出版社,1977:767.
2. 昆明军区后勤部卫生部,《云南中草药选》,第1版,昆明:

- 昆明军区后勤部卫生部,1970:14.
3. 天津市南开区西营门外卫生院冠心病小组,生三七降低血胆固醇的临床观察,天津医药 1973;7:347.
4. 全国冠心病座谈会,《1973年全国冠心病座谈会资料选编》,第1版,北京:人民卫生出版社,1974:331—333.
5. 张焜,生三七对降低血脂、胆固醇的作用观察,新医药学杂志 1973;10:13.
6. 中国人民解放军总医院冠心病防治小组,三七冠心片治疗冠心病心绞痛68例(127例次)疗效观察,新医药学杂志 1973;10:12.
7. 昆明制药厂,等,三七治疗家兔动脉粥样硬化症的实验研究,云南医药 1974;1:48.
8. Walsh PN, Platelet coagulant activities and hemostasis Blood, 1974; 43:397.
9. Vijayagopal P, et al. Coagulant activity of human plasma lipoproteins from normal and hyperlipidaemic subjects thromb. Res. 1978; 12:721.
10. Bajaj SP, et al. Human plasma lipoproteins as accelerators of prothrombin activation, J Biol Chem. 1976; 251:5233.
11. 王裕生,等,《中药药理与应用》,第1版,北京:人民卫生出版社,1983:42.

中药大延汤治疗带状疱疹70例疗效观察

武汉长航总医院皮肤科 漆频安

近年来,我们运用自拟中药复方大延汤,治疗带状疱疹70例,取得较好疗效,报告如下。

临床资料 本组70例均经临床确诊为带状疱疹普通型。其中男54例,女16例。年龄:5~83岁,其中21~40岁28例。发病部位:躯干、左侧胸至背部16例,右侧胸至背部22例,头面部1例,四肢14例,颈部4例,腰臀部13例。

治疗方法 全部病例均单纯服用中药大延汤(大青叶12g 延胡索6g 板蓝根15g 黄芩12g 防己6g 白芷9g 紫草6g 金银花12g 党参12g 白藜皮9g 甘草6g)。每日一剂,水煎2次早晚分服。其中9例患者并外搽2%龙胆紫液或龙胆紫膏。70例均未使用其他内服或注射药物。

疗效观察 按照皮疹全部消退,自觉症状基本消失或完全消失,不留后遗症神经痛等为治愈标准,70例患者经1~19天治疗全部治愈。其中1~3天治愈11例;4~6天治愈45例;7~9天治愈9例;10天以上

治愈5例。平均治愈时间为6.9天,80%病例在6天以内治愈。大部分病例服药3~4天后,皮疹停止发展,疼痛减轻;服药6~9天疼痛消失,疱疹干燥结痂而痊愈。全部病例在服药期间均未发现明显副作用。

体会 既往我院对该病治疗一般采用维生素B₁₂、B₁肌肉注射,口服病毒灵及止痛片等,疗效不显著,疗程较长。中医称该病为“缠腰火丹”,俗称“蜘蛛疮”。因肝火妄动,湿热内蕴所致。治则应以清热利湿解毒、化瘀通络理气为是。自拟大延汤中板蓝根、大青叶、金银花、黄芩、紫草清热解毒,且有抗病毒作用;延胡索、白芷、防己活血行气、祛风止痛;白藜皮清热燥湿;党参扶正,提高网状内皮系统的吞噬功能,且能增加机体免疫球蛋白含量;甘草解毒,调和诸药。共奏清热解毒、利湿化瘀、理气止痛之功,恰中带状疱疹病机,治疗效果显著,疗程短,药费少,不留后遗症神经痛等。