

· 病例报告 ·

治愈右侧输尿管炎性狭窄并发肾盂积水1例报告

黑龙江省祖国医药研究所 张琪

苏×× 女 35岁 1980年12月15日初诊。
主诉：患肾盂积水已有半年余，经中西医治疗未见好转。

现病史：患者于1980年6月下旬自觉腰轻度痛，后于7月1日中午突然出现无痛性尿血，无尿频、尿急感，是日深夜又出现右侧腰部牵引下腹剧烈痛，急以肾绞痛原因待查入当地医院治疗，经注射杜冷丁后疼痛缓解。尿检红细胞满视野，白细胞(++)，蛋白(+)，X线腹部平片(-)，给予消炎、止痛治疗后，腰痛血尿均消失，尿检(-)，10天后出院。(住院期间曾用青霉素、链霉素以及清热利尿等中药)。8月初，又发生绞痛一次，但较前一次为轻，无血尿，仍用上法治疗后缓解。8月15日肾盂排泄性尿路造影示：右肾盂积水(中度)，右输尿管迂曲、肾下垂(见图1)。

1980年10月入某院治疗，诊断为肾结石。给予中药排石汤等治疗两个月，经肾盂造影(片号5017)积水仍无改善，肾图示下尿路梗阻，超声波探查右肾肿大。同年11月下旬又转入某医院，经逆行肾盂造影，诊为右侧输尿管炎性狭窄并发肾盂积水(片号8917)给予消炎、理疗等治疗，仍不见好转，准备手术，本人不同意，故来本所门诊求治。

证见面色㿠白，神疲乏力，夜间手足发热，腰部不适感，无尿频、尿急、尿痛，尿检(-)。脉沉，舌面湿润。施温阳利水兼以活血之法，以金匮肾气丸加味：熟地25g 山药15g 茯苓15g 丹皮15g 泽泻15g 枸杞子15g 肉桂7.5g 附子7.5g 车前子15g 怀牛膝15g 甘草7.5g 丹参15g 莪丝子15g 水煎服，每日一剂。

服上方30余剂后，自觉腰部不适好转。1981年2月16日排泄性尿路造影右侧输尿管通畅，肾盂积水基本消失(见图2)。效不更方，继用上法，巩固疗效。

按：祖国医学并无肾盂积水名称及类似描述，但对水液停聚则论述颇多。其产生的病因又多责之于阳气不足。《金匮要略》谓：“病痰饮者当以温药和之”。张景岳谓：“阳王(旺)，则气化水即为精，阳衰则气不化而精即为水”。可见积水之不同，故《金匮要略》病痰饮分别用苓桂术甘汤和肾气丸主治，前者在脾，而后者在肾。本病须温肾利水，用肾气丸加味，补肾温阳利水，佐以活血之品，服药30剂后，腰部不适大减，经排泄性尿路造影，右侧输尿管通畅，肾盂积水基本消除，继用上方以巩固疗效。

追访三年未复发，早已上班工作。



图 1 1980年8月15日治疗前排泄性尿路造影，右肾盂积水，右输尿管迂曲，肾下垂



图 2 1981年2月16日治疗后排泄性尿路造影，右侧输尿管通畅，肾盂积水基本消失