

补消兼行，使补而不留瘀，消而不伤正。

本例初用激素有效，但维持用药时间不足，且血小板对激素产生依赖性，三次减药均迅即引致血小板下降，甚至出现多处出血的危候。同时，大剂量的激素，又引起医源性肾上腺皮质机能亢进。中医治疗后，虽激素减量较快，但血小板稳步上升，激素停逾半年，未见反复，且诸证悉愈，类柯兴氏综合征亦得纠正，棘手危证，经中西药综合治疗，竟获全功。

南通蛇药片治疗隐翅虫皮炎58例

湖北省松滋县人民医院皮肤科 胡孝南

我科应用南通蛇药片(以下简称蛇药片)治疗隐翅虫皮炎58例，效果良好，报告如下。

一般资料 本组病例均为夏日乘凉或睡眠醒后发现面颈，胸背，上下肢等处出现单一或多处条索状、片状、斑块状、点状水肿性红斑，其上有密集排列的小丘疹，水疱，脓疱。自觉灼痛。符合隐翅虫皮炎的诊断。其中男40例，女18例。年龄13~55岁。

治疗方法 所用蛇药片为江苏南通制药厂生产之南通蛇药片(又称季德胜蛇药片)，每片0.3g。使用时用10ml左右冷开水放蛇药片6~8片融散搅拌调成稀糊状涂擦皮疹。半小时左右1次，每天涂4~10余次不等。直至痊愈。不内服或外用其他药物。

治疗效果 以疼痛消失，皮疹消退或留有少许红斑或色沉斑为治愈标准。

本组58例全部治愈。其中2天治愈者2例(占3.44%)，3天治愈者31例(占53.44%)，4天治愈者22例(占37.95%)，5天治愈者3例(占5.17%)。平均治愈为3.45天。治疗中，平均水疱干涸吸收为1.35天，疼痛消失为2.1天，红斑消退约为3.3天。治疗效果与性别、年龄无关。

体会 隐翅虫皮炎是隐翅虫爬行人体时被压死或拍击损碎了虫体，生殖器内毒素沾染皮肤而引起的皮肤损害。为夏秋季较常见的皮肤病之一。其病程1~2周不等。

蛇药片是蛇医专家季德胜的秘方，由多种中草药加工配制而成。主治毒蛇毒虫咬伤。具有解毒、止痛、消炎之功效，用于治疗隐翅虫皮炎除蛇药片解毒、止痛、消炎的功效起主要治疗作用外，调成稀糊状的蛇药片涂擦皮损处起到湿敷作用，促进炎症的消退，故能获得良好治疗效果。

本组58例病人发疹当天就诊者51例，发疹第二

天就诊者7例，均为疾病的早期。应用蛇药片后能迅速控制疾病的发展。因此可排除疾病的自然转归。

应用蛇药片治疗隐翅虫皮炎治疗时间短，方法简单，疗效确切。且无禁忌和任何副作用，不失为治疗本病之良法。

肩关节脱位侧卧整复法

长春市铁北医院 孙景华

肩关节脱位是骨伤科临床中比较常见的损伤，在各种关节全脱位中肩关节脱位占第一位。1979年1月，我院遇一例严重驼背畸形者患肩关节脱位，在通常的仰卧、俯卧诸整复法均不适用的情况下，运用侧卧整复法试复成功。此后，遂将这种方法用于临床。五年多来，我们运用“肩关节脱位侧卧整复法”治疗肩关节脱位27例，报告如下。

临床资料 男21例，女6例。最小年龄19岁，最大年龄52岁；其中25岁至35岁16例。工人13例，农民6例，学生3例，其他5例。皆系新鲜脱位，当日来诊23例，伤后1日来诊3例，伤后3日来诊1例。一次性脱位26例，习惯性脱位1例。均为前方型，单纯性(即未合并血管、神经及骨质损伤)。

整复手法 患者侧卧在诊察床上，患侧朝上。其侧卧床上的方向宜斜，头、足分别向着床之两个对角，头肩之后侧适与床缘平齐。助手半蹲于患者头肩朝向的床边，一手臂绕过患者之背部，患侧腋下，另手臂绕过患者之健侧肩锁部、胸前，两手在患肩下、前方扣合。术者上床，两足分别踏在患者胸前与背后的床面上，面向患者头肩，在弯腰的姿势下，使患肢肘屈90°，一手把持其上臂，另手把持其前臂(以与患者患肢同侧的手与患肢手部相扣，另手由患肢肘之内、前方伸入抵上臂上段；或以与患者患肢对侧的手握持半屈的前臂，另手由患肢肘之内、前方插入握持上臂上段)。在助手用力向患者之健侧、头侧牵引其躯干的同时，术者将患肢向相反方向牵引。一般此时即可收到已获复位的弹跳感。尚未复位时，经过上述充分对抗牵引并在持续牵引之下，术者轻轻对患侧上臂做内外旋转，内收外展、前屈后伸等动作，遂可完成复位。

讨论 本法同肩关节脱位的几种常用整复手法比较，具有如下一些优点：1. 简便易行，节省人力，仅需术者、助手各一人，且助手可由随员充任；而天津医院骨科“牵引推拿法”需多达四人共同操作。

2. 整复时间短，一、两分钟即可完成整复；而Milch氏法、Stimson氏法需时较长，Ю.Ю. Джа-