

补消兼行，使补而不留瘀，消而不伤正。

本例初用激素有效，但维持用药时间不足，且血小板对激素产生依赖性，三次减药均迅即引致血小板下降，甚至出现多处出血的危候。同时，大剂量的激素，又引起医源性肾上腺皮质机能亢进。中医治疗后，虽激素减量较快，但血小板稳步上升，激素停逾半年，未见反复，且诸证悉愈，类柯兴氏综合征亦得纠正，棘手危证，经中西药综合治疗，竟获全功。

南通蛇药片治疗隐翅虫皮炎58例

湖北省松滋县人民医院皮肤科 胡孝南

我科应用南通蛇药片(以下简称蛇药片)治疗隐翅虫皮炎58例，效果良好，报告如下。

一般资料 本组病例均为夏日乘凉或睡眠醒后发现面颈，胸背，上下肢等处出现单一或多处条索状、片状、斑块状、点状水肿性红斑，其上有密集排列的小丘疹，水疱，脓疱。自觉灼痛。符合隐翅虫皮炎的诊断。其中男40例，女18例。年龄13~55岁。

治疗方法 所用蛇药片为江苏南通制药厂生产之南通蛇药片(又称季德胜蛇药片)，每片0.3g。使用时用10ml左右冷开水放蛇药片6~8片融散搅拌调成稀糊状涂搽皮疹。半小时左右1次，每天涂4~10余次不等。直至痊愈。不内服或外用其他药物。

治疗效果 以疼痛消失，皮疹消退或留有少许红斑或色沉斑为治愈标准。

本组58例全部治愈。其中2天治愈者2例(占3.44%)，3天治愈者31例(占53.44%)，4天治愈者22例(占37.95%)，5天治愈者3例(占5.17%)。平均治愈为3.45天。治疗中，平均水疱干涸吸收为1.35天，疼痛消失为2.1天，红斑消退约为3.3天。治疗效果与性别、年龄无关。

体会 隐翅虫皮炎是隐翅虫爬行人体时被压死或拍击损碎了虫体，生殖器内毒素沾染皮肤而引起的皮肤损害。为夏秋季较常见的皮肤病之一。其病程1~2周不等。

蛇药片是蛇医专家季德胜的秘方，由多种中草药加工配制而成。主治毒蛇毒虫咬伤。具有解毒、止痛、消炎之功效，用于治疗隐翅虫皮炎除蛇药片解毒、止痛、消炎的功效起主要治疗作用外，调成稀糊状的蛇药片涂搽皮损处起到湿敷作用，促进炎症的消退，故能获得良好治疗效果。

本组58例病人发疹当天就诊者51例，发疹第二

天就诊者7例，均为疾病的早期。应用蛇药片后能迅速控制疾病的发展。因此可排除疾病的自然转归。

应用蛇药片治疗隐翅虫皮炎治疗时间短，方法简单，疗效确切。且无禁忌和任何副作用，不失为治疗本病之良法。

肩关节脱位侧卧整复法

长春市铁北医院 孙景华

肩关节脱位是骨伤科临床中比较常见的损伤，在各种关节全脱位中肩关节脱位占第一位。1979年1月，我院遇一例严重驼背畸形者患肩关节脱位，在通常的仰卧、俯卧诸整复法均不适用的情况下，运用侧卧整复法试复成功。此后，遂将这种方法用于临床。五年多来，我们运用“肩关节脱位侧卧整复法”治疗肩关节脱位27例，报告如下。

临床资料 男21例，女6例。最小年龄19岁，最大年龄52岁；其中25岁至35岁16例。工人13例，农民6例，学生3例，其他5例。皆系新鲜脱位，当日来诊23例，伤后1日来诊3例，伤后3日来诊1例。一次性脱位26例，习惯性脱位1例。均为前方型，单纯性(即未合并血管、神经及骨质损伤)。

整复手法 患者侧卧在诊察床上，患侧朝上。其侧卧床上的方向宜斜，头、足分别向着床之两个对角，头肩之后侧适与床缘平齐。助手半蹲于患者头肩朝向的床边，一手臂绕过患者之背部，患侧腋下，另手臂绕过患者之健侧肩锁部、胸前，两手在患肩下、前方扣合。术者上床，两足分别踏在患者胸前与背后的床面上，面向患者头肩，在弯腰的姿势下，使患肢肘屈90°，一手把持其上臂，另手把持其前臂(以与患者患肢同侧的手与患肢手部相扣，另手由患肢肘之内、前方伸入抵上臂上段；或以与患者患肢对侧的手握持半屈的前臂，另手由患肢肘之内、前方插入握持上臂上段)。在助手用力向患者之健侧、头侧牵引其躯干的同时，术者将患肢向相反方向牵引。一般此时即可收到已获复位的弹跳感。尚未复位时，经过上述充分对抗牵引并在持续牵引之下，术者轻轻对患侧上臂做内外旋转，内收外展、前屈后伸等动作，遂可完成复位。

讨论 本法同肩关节脱位的几种常用整复手法比较，具有如下一些优点：1. 简便易行，节省人力，仅需术者、助手各一人，且助手可由随员充任；而天津医院骨科“牵引推拿法”需多达四人共同操作。

2. 整复时间短，一、两分钟即可完成整复；而Milch氏法、Stimson氏法需时较长，Ю. Ю. Джа-

Heald氏法需时更长，常需一、两刻钟方可完成整复。

3. 技术要领容易掌握，成功率高。本组27例均一次整复成功。

4. 安全，无引起副损伤之危险。本组27例无一例由于整复造成血管、神经及骨损伤；而Kocher氏法引起肱骨外科颈、大血管、臂丛神经及肌纤维损伤的危险性大，Hippocrates氏法也可由足底蹬伤腋部神经、血管。

5. 不增加关节囊损伤，康复快。本组27例康复时间10~14天（其中有一例系大卡车司机，整复次日即开始驾车，随访四年未发生再脱位及其他后遗症）；而其他整复方法多需三周以上始可康复。

6. 适用于严重驼背畸形者肩关节脱位的整复。

7. 从原理来看，此法适用于各种类型肩关节脱位的整复，但由于后脱位极为罕见，故对后脱位的整复效率有待临床证实。

中药鼠妇外治各种疣赘的经验

河北省皮肤病防治所 刘耀驰

鼠妇，俗称潮虫。近年来，我们根据民间传说，试用该药外治寻常疣、扁平疣、鸡眼等各种疣赘，获良好效果，报道如下。

一般资料 1. 寻常疣45例，男25例，女20例。2. 扁平疣30例，男16例，女14例；3. 脚鸡眼80例，男54例，女26例。发病1~2年34例，2~3年15例，3~5年18例，5年以上13例。

用药方法 用鲜活鼠妇，直接将虫体和液汁涂抹患处。用量据疣和鸡眼大小及数目而定，一般每个患处每次用1~5枚鼠妇，扁平疣平均每个疣用1~2枚，日一次。如疣布满全脸，密集成群，可用鼠妇百余枚，包在消毒纱布内，将液汁涂擦患处，多次反复涂擦至液汁尽止，日一次。

治疗结果 1. 寻常疣45例中，痊愈38例占84.4%，好转4例占8.4%，无效3例占6.3%，总有效率92.8%。2. 扁平疣30例中，痊愈19例占63.3%，好转6例占20%，无效5例，总有效率83.3%。3. 鸡眼80例中痊愈68例占85%，好转8例占10%，无效4例占5%，总有效率95%。其中用药1~5次痊愈45例，5~10次痊愈18例，10次以上痊愈5例。

体会 鼠妇(Armadillidium vulgare Latreille)，性寒凉，味酸无毒。具有清热解毒，破瘀，消症瘕之功效。本资料表明该药外用治疗各种疣赘有较好疗效，大部分病人用药3~5次即获好转或痊愈。同时我们

还用于外治脚湿气，癰疽疔瘡，酒糟鼻等均有一定疗效。本药药源丰富，方法简单，经济价廉，又无副作用。值得进一步临床观察和研究。

茵陈黄花汤治疗蚕豆黄25例

宜昌市六七一医院 郑丙雄

蚕豆黄是因吃蚕豆或蚕豆制品所诱发的血管内急性溶血性贫血。我院用中药茵陈黄花汤治愈25例，报告如下。

一般资料 25例中男20例，女5例；年龄最大者5岁，最小11个月；病程最长48小时，最短6小时。伴有休克、昏迷、惊厥者7例。

诊断依据 1. 有服蚕豆史；2. 临床表现突然起病，发烧、畏寒、腹痛、黄疸、酱油样尿等。重症者伴有休克、昏迷、惊厥；3. 排除其他中毒所致黄疸。

治法及结果 1. 均服中药茵陈黄花汤，方剂组成：生地15g 茵陈30g 黄花草20g 狗脊9g。水煎服，一日一剂。如呕吐加法半夏9g 陈皮9g。2. 重症患者伴有休克或心肾功能衰竭者，适当静脉补液（葡萄糖生理盐水500~1,000ml加维生素C1g）。未用其他任何药物。

结果 25例中18例只经服中药2~4剂获愈，7例重症者配合适当补液也经服中药2~4剂而愈。

体会 本病发病凶险，如不及时抢救，可在24~48小时死亡。本资料表明茵陈黄花汤加减治疗蚕豆黄病有较好疗效。特别是在基层医院，抢救条件有限的情况下，用中药治疗，方法简便。

全国中西医结合虚证与老年病研究专业委员会成立

经中国科协批准，全国中西医结合虚证与老年病专业委员会成立，成立大会于1984年10月21~25日在山东烟台召开，同时召开了全国第二次学术讨论会。专业委员会主任委员邱安堃，副主任委员陈可冀、沈自尹，委员27人。秘书蒋槐、王文健。挂靠单位：中国中西医结合研究会上海分会。

(陈冬燕)