

Heald氏法需时更长，常需一、两刻钟方可完成整复。

3. 技术要领容易掌握，成功率高。本组27例均一次整复成功。

4. 安全，无引起副损伤之危险。本组27例无一例由于整复造成血管、神经及骨损伤；而Kocher氏法引起肱骨外科颈、大血管、臂丛神经及肌纤维损伤的危险性大，Hippocrates氏法也可由足底蹬伤腋部神经、血管。

5. 不增加关节囊损伤，康复快。本组27例康复时间10~14天（其中有一例系大卡车司机，整复次日即开始驾车，随访四年未发生再脱位及其他后遗症）；而其他整复方法多需三周以上始可康复。

6. 适用于严重驼背畸形者肩关节脱位的整复。

7. 从原理来看，此法适用于各种类型肩关节脱位的整复，但由于后脱位极为罕见，故对后脱位的整复效率有待临床证实。

中药鼠妇外治各种疣赘的经验

河北省皮肤病防治所 刘耀驰

鼠妇，俗称潮虫。近年来，我们根据民间传说，试用该药外治寻常疣、扁平疣、鸡眼等各种疣赘，获良好效果，报道如下。

一般资料 1. 寻常疣45例，男25例，女20例。2. 扁平疣30例，男16例，女14例；3. 脚鸡眼80例，男54例，女26例。发病1~2年34例，2~3年15例，3~5年18例，5年以上13例。

用药方法 用鲜活鼠妇，直接将虫体和液汁涂抹患处。用量据疣和鸡眼大小及数目而定，一般每个患处每次用1~5枚鼠妇，扁平疣平均每个疣用1~2枚，日一次。如疣布满全脸，密集成群，可用鼠妇百余枚，包在消毒纱布内，将液汁涂擦患处，多次反复涂擦至液汁尽止，日一次。

治疗结果 1. 寻常疣45例中，痊愈38例占84.4%，好转4例占8.4%，无效3例占6.3%，总有效率92.8%。2. 扁平疣30例中，痊愈19例占63.3%，好转6例占20%，无效5例，总有效率83.3%。3. 鸡眼80例中痊愈68例占85%，好转8例占10%，无效4例占5%，总有效率95%。其中用药1~5次痊愈45例，5~10次痊愈18例，10次以上痊愈5例。

体会 鼠妇(Armadillidium vulgare Latreille)，性寒凉，味酸无毒。具有清热解毒，破瘀，消症瘕之功效。本资料表明该药外用治疗各种疣赘有较好疗效，大部分病人用药3~5次即获好转或痊愈。同时我们

还用于外治脚湿气，癰疽疔瘡，酒糟鼻等均有一定疗效。本药药源丰富，方法简单，经济价廉，又无副作用。值得进一步临床观察和研究。

茵陈黄花汤治疗蚕豆黄25例

宜昌市六七一医院 郑丙雄

蚕豆黄是因吃蚕豆或蚕豆制品所诱发的血管内急性溶血性贫血。我院用中药茵陈黄花汤治愈25例，报告如下。

一般资料 25例中男20例，女5例；年龄最大者5岁，最小11个月；病程最长48小时，最短6小时。伴有休克、昏迷、惊厥者7例。

诊断依据 1. 有服蚕豆史；2. 临床表现突然起病，发烧、畏寒、腹痛、黄疸、酱油样尿等。重症者伴有休克、昏迷、惊厥；3. 排除其他中毒所致黄疸。

治法及结果 1. 均服中药茵陈黄花汤，方剂组成：生地15g 茵陈30g 黄花草20g 狗脊9g。水煎服，一日一剂。如呕吐加法半夏9g 陈皮9g。2. 重症患者伴有休克或心肾功能衰竭者，适当静脉补液（葡萄糖生理盐水500~1,000ml加维生素C1g）。未用其他任何药物。

结果 25例中18例只经服中药2~4剂获愈，7例重症者配合适当补液也经服中药2~4剂而愈。

体会 本病发病凶险，如不及时抢救，可在24~48小时死亡。本资料表明茵陈黄花汤加减治疗蚕豆黄病有较好疗效。特别是在基层医院，抢救条件有限的情况下，用中药治疗，方法简便。

全国中西医结合虚证与老年病研究专业委员会成立

经中国科协批准，全国中西医结合虚证与老年病专业委员会成立，成立大会于1984年10月21~25日在山东烟台召开，同时召开了全国第二次学术讨论会。专业委员会主任委员邱安堃，副主任委员陈可冀、沈自尹，委员27人。秘书蒋槐、王文健。挂靠单位：中国中西医结合研究会上海分会。

(陈冬燕)