

2. 沈自尹, 等. 老年人与“肾阳虚”患者的甲状腺轴功能对比观察. 中西医结合杂志 1982; 2: 1.
3. 王文健, 等. 肾阳虚患者和老年人(男性)的下丘脑—垂体—性腺轴功能初步观察. 中西医结合杂志 1982; 2: 3.
4. 上海第一医学院脏象研究室. 肾阳虚病人的垂体—肾上腺皮质系统的改变. 上海中医药杂志 1979; 2: 37.

酸枣树皮煎剂治疗烧伤创面

广西桂林市人民医院外科 杨翔发 钱 畅

我院自1970年3月开始应用酸枣树皮煎剂治疗烧伤创面以来, 至1983年9月, 共收治500例患者, 除5例死亡外, 其余全部治愈。

药物的配制 酸枣树 [*Choerospondias axillaris* (Roxb) Burtt et Hill], 又名五眼果树, 属漆树科, 为落叶乔木, 产于中南及云南、贵州、福建、浙江。其树皮煎剂对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌均有抑制作用。用酸枣树的内皮层, 每1~2kg加水5000ml, 煎煮4~5小时, 过滤去渣, 再浓缩成500ml, 灭菌密封备用。

治疗方法 概括地说, 就是清、吹(烤)、涂、暴露等方法。用1/5000高锰酸钾溶液清洗创面, 用电吹风吹干或烤干, 然后涂酸枣树皮煎剂1~2次, 一般10~30分钟可形成一层薄的药膜, 24小时可形成定痂, 浅Ⅰ度和深Ⅰ度均可痂下愈合, 小面积Ⅱ度也可痂下愈合。较大面积的Ⅱ度烧伤3~4周后用盐水浸泡脱痂后植皮。感染创面的处理: 经消毒生理盐水清洗去痂, 吹干后也可涂酸枣树皮煎剂, 还能获痂下愈合。烧伤严重的患者要配合使用抗生素及抗休克治疗。

治疗效果 本组轻度烧伤324例(64.8%)、中度烧伤109例(21.8%)、重度烧伤67例(13.4%)。500例中, 治愈495例, 治愈率99%, 死亡5例, 病死率为1%。治疗病例中面积最大者96%, 最小者0.5%; 治愈病例中, 面积最大为74%, 平均面积11.9%。平均住院日数15.7天。

体会 本法治疗有效地减少了创面的蒸发和渗出。我们对烧伤面积20%以下的患者不补液或少量补液就能度过休克关, 而对大面积烧伤患者, 采用小量输血、输液。我们的经验是成人每日补盐水1000ml、葡萄糖液2000ml, 小儿则用含糖盐水50ml/kg体重, 葡萄糖液50ml/kg体重补充, 均能度过休克关。本组无一例因早期休克而死亡。本法药痂形成后能防止感染、保护痂皮及促进痂下上皮细胞的新生, 与包扎疗法比较, 本法具有简便易行、疗程短、感染少、疤痕少等优点。

补益法抗单纯疱疹病毒性角膜炎复发的初步尝试

江苏省沭阳县中医院眼科 潘开明 冯佩诗

单纯疱疹病毒性角膜炎(下称单疱角膜炎)为眼科的常见病之一。近年来, 笔者应用中医的补益法为主治疗30例, 经二年以上随访, 疗效较为满意。

一般情况 30例均为炎症后期患者, 男22例, 女8例; 年龄在18~47岁之间; 复发次数最少者3次, 最多者7次; 病程长者二年半, 短者七月余; 随访一年内复发一例, 占3%, 二年内复发三例, 占10%。

中药基本方剂 黄芪30g 党参30g 菟丝子15g 枸杞子15g 山萸肉12g 五味子9g 女贞子15g 黄精18g 丹参10g 川芎9g 陈皮9g 升麻9g 柴胡9g。一般在炎症后期开始服用, 本文30例最多服65剂, 最少20剂。每日一剂, 分二次水煎服。

典型病例 张××, 男, 39岁, 干部。一年前右眼患单疱角膜炎经治而愈, 后反复发作, 一年内已发作四次。兼头痛, 头昏, 乏力。1979年7月5日初诊。检查: 右眼视力0.2, 混合型充血+++, 角膜盘状浸润, 实质层水肿+, 红汞不着色, 瞳孔正常。舌红润, 苔薄, 有齿痕, 脉浮数。诊断: 右眼复发性单疱角膜炎(盘状)。

治疗用基本方加荆芥10g 防风10g 决明子18g。10剂后复诊症状较前改善, 四肢较前有力, 但不能持久, 纳差, 多梦。以基本方黄芪、党参各减至15g, 黄精减为12g, 加石决明18g, 珍珠母30g, 茯神15g, 麦冬12g, 连服20剂, 上述症状消失, 舌、脉均正常。1981年9月10日复查, 视力1.0, 角膜留有云翳, 2年多来, 一直未复发。

体会 单疱角膜炎为一典型的病毒潜在性感染性疾病, 反复发作作为主要特点, 常连绵多日。“新病多实, 久病多虚”, “实则邪气实, 虚则正气虚”。此“虚”一方面是指机体内物质的亏损, 另一方面为机体生理功能低下, 因而使机体抵抗力减弱。按“虚则补之”的治则, 在本病后期, 应用补益法增强机体自身抵抗力, 以防复发是有效的临床依据。

谢立信报道用物理或化学方法治疗57例, 2年内复发为53%, 用转移因子治疗81例, 2年内复发为14%。杨玉霞等用中医治疗29只眼, 2年内复发为26.9%。笔者用补益法治疗30例, 2年内复发占10%。但由于病例少, 又未能作细胞免疫功能测定, 到底补益法对免疫功能影响如何, 尚待进一步探索。