

剂。适于外邪化热、肺胃热盛、发热、咳嗽气喘或口渴烦躁^①。我们应用麻杏石甘汤加味治疗嗜酸细胞增多性肺炎26例，取得较好疗效，且无明显不良反应，从而为本病的治疗提供了一个值得探索的、新的方法。

麻杏石甘汤还可用于治疗荨麻疹^②。嗜酸细胞增多性肺炎及荨麻疹均属于变态反应性疾病，进而提示麻杏石甘汤可能在一定程度上改变了机体的免疫反应状态，尚待进一步阐明。

本组病例平均住院仅9天，故不能以嗜酸细胞在多数病例尚未 $<7\%$ 来否定加味麻杏石甘汤对嗜酸细胞增多性肺炎的疗效^③。

参 考 文 献

1. 上海中医学院中医基础理论教研组. 中医方剂临床手册. 第1版. 上海: 上海人民出版社, 1974: 163.
2. 王怡康. 用麻杏石甘汤治荨麻疹. 新医药学杂志1978; 7: 24.
3. 沈际皋, 等. 热带嗜酸性细胞增多症14例. 中华儿科杂志1963; 12(3): 147.

中西医结合治愈2例“妊毒症”慢性肾损害

北京新华彩印厂卫生所 王鸣声

妊娠中毒症是妊娠期的特发性疾病。大多数病人在分娩后都可以完全恢复正常，也有少数病人可出现持续性高血压与/或肾损害，甚至严重损害病人健康与劳动力。现将我们应用中西医结合方法治疗成功的2例报告如下。

病例1 李××，33岁。孕34周查体发现血压180/120，浮肿(++)，尿蛋白(++)，镜检(-)。诊为双胎合并重度妊娠中毒症而住××医院。既往无肾病史。给予降压、镇静、利尿等治疗，27天后分娩一对男婴，10天后出院。出院后第3天突然剧烈头痛，头晕，呕吐，心烦不寐，精神恍惚。检查：血压210/120，尿蛋白(+++)，红细胞2~3，白细胞0~1。当即加强降压，镇静治疗同时给予中医治疗。初诊：面赤，口干，舌淡红，苔微黄，脉细弦，证属精血耗亏，水不涵木而致肝阳上亢。以平肝潜阳为治则，方用：钩藤、菊花各15g 龙齿、山萸肉各10g 珍珠母20g 琥珀、生地各6g 杞果、云苓各12g 水煎服。三天后复诊：头痛减轻，吐止，夜能入睡，血压160/100，尿蛋白(++)，镜检(-)。仍以上方加减服用月余，症状消退，血压120/80，但尿蛋白仍持续在(+++)~(++)，并有腰困腿软，神疲纳少。舌胖有齿痕，色淡暗，苔薄白，脉缓滑，证属脾肾阳虚。方用：人参(或党参)、杜仲、山萸肉、赤芍、川芎各10g 黄芪、大腹皮各15g 白术、牛膝各6g 水煎服。据证加减服用10月余，尿蛋白逐渐阴转，随访四年未再复发。

病例2 王××，30岁，初产。于产前10天因气憋，头晕、恶心，水肿而住××医院。既往无肾病史。检查：血压150/100，浮肿(+++)，尿蛋白(+)

+)，诊为重度妊娠中毒症。给予降压、利尿治疗。分娩后血压120/80，水肿消退而出院。但尿蛋白仍持续在(+)~(+++)，镜检红、白细胞0~2，经青霉素、强的松治疗无效而停药，改用消炎痛治疗。服药尿蛋白减少，停药则复发。乃加中医治疗。初诊：倦怠乏力，大便溏，小便清长，面色晄白，舌质淡胖，苔白腻。证属脾肾阳虚，以温肾、益气、健脾为治则。方用真武汤合全生白术散加减：党参、白术各10g 茯苓12g 大腹皮、杜仲、牛膝、巴戟天各6g 肉桂3g 水煎服，连服3个月后以大量黄芪(60g/d)、党参为主据证加减治疗半年余，尿蛋白完全消退，随访四年未再复发。

讨 论 妊娠中毒症属中医学“子肿”，“子烦”，“子痫”范畴。受孕后全身精血聚以养胎，阴血必亏，肝木失养，肝阳化风，临床则出现头痛，头晕，高血压，抽搐甚或昏迷等症。本文例1病初出现肝阳上亢之证，以平肝潜阳，方用钩藤汤、杞菊地黄汤加减取得满意效果。至于慢性持续性蛋白尿多属脾肾两虚证，中医学认为脾气虚中气不足，上不能升清以养肺，下不能制水以助肾。肾主藏精，肾气不足封藏失司则精气外泄；脾主运化，脾气虚陷统摄无权精微下注。此刻临床出现水肿及蛋白尿等。故重用健脾温肾药，如党参、黄芪、白术、肉桂、巴戟天、杜仲等收到良效。此外，中医学认为，“久病在血、久病血瘀”，“产后多气血虚弱，产后多血瘀”，主张祛瘀治之可取“瘀血去，新血生”之效。现代医学认为活血化瘀治疗可改善肾脏微循环，增加肾小球滤过率，减少毛细血管对蛋白质的通透性，从而使尿蛋白减少或消失。故采用温肾、益气、健脾佐以活血化瘀治疗。