

药物分子进入细胞浆,对细胞中存在DNA聚合酶 α 活性产生抑制作用,患者骨髓细胞 ^3H -TdR标记指数降低,影响细胞核中DNA合成,因此白血病细胞发生形态改变,出现核溶而产生疗效。

治疗慢粒的药物尚有:牛黄解毒片,每次2~6片,每日四次;六神丸,每次30粒,每日三次;此外,雄黄以及从广西卫矛科植物密花美登木中分离出的卫矛醇,经酯化、离子交换而合成的1.2:5.6二去水卫矛醇,简称DAD等,治疗慢粒均有一定的疗效。

中西医结合治疗慢性再生障碍性贫血

黑龙江中医学院附属医院内科血液组

于材声

慢性再生障碍性贫血,是多种原因、不同机理所致骨髓容量减少,造血功能衰竭,引起全血细胞减少的一组综合征。临床虽以贫血、出血表现为主,但常伴随一些错综复杂的症候,病情轻重悬殊很大,治疗效果不一。中医学认为本病属于“血虚”、“血证”、“虚劳”范畴。其病因病机与脾肾最为密切,主要在肾。肾为先天之本,肾主骨生髓,肾藏精,精血可以互相化生。脾为后天之本,气血生化之源。在辨证分型中,我体会把慢性再障分为肾阴虚型(包括肝肾阴虚)和肾阳虚型(包括脾肾阳虚),即可达到治疗效果。

肾阴虚型:以头晕,耳鸣,手足心热或午后微热,腰膝酸软,失眠多梦,心悸气短,遗精便秘,常伴有出血倾向(齿衄、肌衄、鼻衄等)。舌质淡、尖红,脉弦数、细数为主证。治宜滋补肾阴,填精益髓之法。常用方药:生地25g 麦冬15g 女贞子15g 丹皮15g 旱莲草30g 红参10g单煎 黄芪50g 当归15g 枸杞果15g 云苓15g 白术15g 山药15g 鸡血藤20g 首乌30g 肉苁蓉15g 补骨脂15g 甘草20g。

肾阳虚型:以形寒肢冷,四肢不温,腰膝无力,阳痿不举,遗精滑精,面色苍白,大便溏泻,舌质淡白,脉沉细或弱为主证,应以温补肾阳,益气壮肾之法治之。常用方药:红参10g单煎 鹿茸2.5g冲服 黄芪50g 熟地20g 当归15g 枸杞果15g 白术15g 山药15g 云苓15g 补骨脂15g 巴戟15g 仙灵脾15g 附子15g 肉桂15g 怀牛膝15g 鹿角胶15g。遇有严重出血者,以清热凉血止血之法治疗,常用犀角2.5g单煎 生地25g 丹皮15g 石膏50g 知母25g 元参20g 麦冬15g 仙鹤草50g 茜草50g 土大黄15g 三七粉5g冲服 地骨皮15g 没石子15g。

在治疗过程中注意阴阳互根,重用滋阴方药辅

助阳之品,或重用补阳之品辅以滋阴之药。要气血兼顾。肾阴虚型先用滋阴凉血之品,待阴虚症状好转后,逐步加用温补肾阳药,减少滋阴药。滋阴的方法有缓解病情,改善机体状态的作用;温补肾阳可促进造血功能恢复,增强新陈代谢,对造血祖细胞有刺激作用。

慢性再障为一难治性贫血,久病体虚,病程迁延,单纯中药治疗慢性再障疗效虽然肯定,但起效缓慢,疗程长。我们在使用中药基础上又合并康力龙联合治疗慢性再障,经过两年多实践,证明这种联合方法是当前治疗再障的较好方法,它具有疗效肯定,起效快,疗程短的特点,优于任何一种单一用药的方法。

康力龙使用方法:成人每次4~6mg,每日三次口服,疗效发生时间为2~7个月不等,一般用药时间达7个月以上,病情无改善者,可视为无效,停止使用本药,改用其他方法。在取效后,均需使用中药和康力龙维持治疗,时间不得少于6个月至1年以上,以期巩固疗效。

康力龙是一种雄性蛋白同化激素,它具有疗效高,副作用小,使用方便的特点,易为患者所接受。本药的作用原理是通过它的代谢产物刺激多能干细胞,从 G_0 期进入 G_1 期(增殖周期),可以部分的增加单核、巨噬细胞的生成,对粒细胞也有促生成作用。

康力龙主要的副作用:肝功能损害、痤疮、多毛、浮肿、脱发、糖尿病等副作用。康力龙对肝脏的毒性作用以转氨酶增高为主要表现,转氨酶 <200 单位无需停药,转氨酶 >250 单位者停用康力龙后,肝功能可自行恢复正常,不必另用其他保肝药物。在使用康力龙治疗过程中,定期检查尿糖,如出现尿糖改变,需停药观察。中药合并康力龙联合治疗慢性再障这种严重疾病,不仅可减轻康力龙的副作用,而所获得的疗效与对肝脏毒性作用相比,是益处大于副作用的。

中西医结合治疗白细胞减少症的体会

重庆市第二人民医院中西医结合科 邓友安

白细胞减少症是指周围血白细胞计数持续低于 $4000/\text{mm}^3$,致病因素较多,发病机理也未完全阐明。现代医学一般多用利血生、鲨肝醇、维生素 B_{12} 、丙酸睾丸素、肾上腺皮质激素等治疗,脾功能亢进患者可切脾治疗,但疗效并不理想,且停药后易复发。

中医学一般认为本症属脾肾两虚,多采用补益脾肾为主治疗,据报道疗效可达83%。我们从23例白