

用于新生儿硬肿症

刘×, 女, 2天, 1985年3月25日因新生儿硬肿症转入新生儿病房。患儿两下肢大腿外侧及少腹部硬肿, 足背浮肿。心肺(-), 肝肋下2cm, 脾(-)。血常规(-)。经用能量合剂、复方丹参注射液、维生素E等治疗3天, 疗效不显。加用红参1日2g蒸汁入牛奶中晚服, 2天后浮肿消退, 硬肿症开始松解, 5天后全消。

按: 新生儿硬肿症, 多因受寒伤阳而起, 气虚血凝。人参能通血脉, 软化坚积, 配合运用人参能补益元气, 温阳散寒, 促进血液循环, 进而加速硬肿症的消失。此例患儿在运用红参后, 不仅改善了全身状况, 而且也加快了硬肿症消退。

用于低出生体重的新生儿

严××, 女, 1天, 1985年3月17日因呼吸不良入院。患儿足月顺产, 体重1500g, 妇产科拟诊为低出生体重儿。出生后呼吸20次/分左右, 心率60次/分。每约10分钟左右呼吸暂停一次, 需人工呼吸复苏。经多次运用洛贝林、可拉明等呼吸兴奋剂, 疗效不显。血气分析示低氧血症。血生化检查基本正常。加用红参1日2g, 蒸汁用滴管喂服, 2天后呼吸未再暂停, 呼吸频率增加, 每分钟40次左右, 10天后痊愈出院。

按: 低出生体重儿, 一般是指出生时体重不足2500g者, 无论是足月与否。一般说来他们属未成熟儿, 出生后可因呼吸调节功能发育不全, 其中25%可发生呼吸暂停的现象⁽³⁾。人参“补五脏六腑, 保中守神”⁽²⁾, 对低出生体重儿运用人参, 对于使他们尽快适应出生后环境, 适应大气呼吸, 减少死亡率, 均有一定意义。

此例患儿呼吸需人工维持, 加用人参后, 自主呼吸很快就建立了。

讨 论

新生儿患者, 由于各种原因所发生的疾病, 往往虚实交杂, 但即使是实证, 也可以很快致虚, 给予补益支持是需要的。李时珍认为人参能治“一切男女虚症”⁽²⁾。选用人参护持新生儿元气, 力助其他药物, 对于治疗新生儿疾病是十分有益的。过去, 一般认为新生儿是“纯阳”之体, 嫌人参温热而不多用。其实新生儿患病以后, 多数体温不升, 以及“未成熟儿具有某些特点难于维持体温的恒定”^(3,4), 显然是与阳气不足有关, 运用人参, 正合辨证用药之原则。

新生儿人参用量值得注意。我们的经验是, 对于刚离母腹, 1~2天者, 最好少少与之, 红参1日2g左右为宜。早产儿和低出生体重儿, 剂量也不宜大。一般新生儿1日3g左右, 最好用人参蒸汁, 不要用水煎剂, 因其可致新生儿腹泻。个别患儿在剂量过大时(如1日超过6g), 易产生心动过速。个别新生儿在用红参3天后出现红色皮疹和腹泻, 停用后能自行消失。

参 考 文 献

1. 上海中医学院. 中草药. 上海: 上海人民出版社, 1974: 512.
2. 李时珍. 本草纲目. 北京: 人民卫生出版社, 1977: 512, 701.
3. 哈佛大学医学院新生儿科. 新生儿诊疗手册. 天津: 天津科学技术出版社, 1983: 443.
4. 关庆润, 等译(苏联). 乳幼儿疾病学. 北京: 人民卫生出版社, 1956: 41, 58.

华东地区暨江西省中西医结合 精神科专业活动简讯

华东地区中西医结合精神科协作组暨江西省中西医结合研究会精神科学组成立大会于1985年6月7日至9日在江西省精神病院召开, 来自六省一市40位代表参加了会议, 由上海医科大学徐声汉教授、江西医学院吴隆海教授和苏州医学院吴彩云教授主持会议, 大会收到伍正谊教授和罗和春主任的贺信。

会上江西省代表宣读了“金蒲丹片”“桃黄片”治疗精神病的临床疗效分析及工艺制作过程的介绍, 代表

们进行了认真讨论, 肯定成绩, 提出建议。会议还重点讨论了华东协作组的组织形式及研究协作课题, 初步提出了江西的“桃黄片”“金蒲丹片”组, 上海的“达营片”组, 苏州的“气功”组。大家一致表示要知难而进, 搞好协作, 坚定不移地把精神科中西医结合研究搞得更科学化, 为开创精神疾病中西医结合研究新局面而努力奋斗。

(张 斌)