

七天之后即可使用。

用法 取苍耳子虫一条或半条(视疖肿范围大小而定),放在疖肿红肿隆起处。也可将苍耳子虫研成糊状后,放在疖肿表面,若有空隙用沾有苍耳虫浸油的小棉球填满,使苍耳子虫能与疖肿紧密接触。若疖肿在外耳道的下方或肿胀较剧而空隙较小,上药后不易移动者,也可不用小棉球固定。直到第二天换药时取出。每日换药一次。

使用本品时,一般不用任何药物,若疖肿较重引起周围红肿、淋巴结肿大及全身症状时,应加用抗生素治疗。

结果 本组 85 例患者,除 10 例外耳道疖及 8 例鼻前庭疖加用抗生素外,其余 67 例患者均单用此法而治愈,最短者 1 次,最长者 5 次,平均 3 次治愈。多数患者在上药后即感舒适,疼痛减轻。本组病例在使用过程中均未发生过敏反应及其他不良反应。

典型病例 张××,男,8岁。1981年8月25日初诊。患儿于前天上午开始出现右耳疼痛逐渐加剧,疼痛向右侧头部放射,张口时疼痛加剧。查体:在外耳道口9点、12点处可见小丘状隆起充血,压痛,压耳屏及牵拉耳廓时痛剧。诊断:外耳道疖。取苍耳虫一条放在两疖肿之上,用沾有苍耳虫浸油的小棉球固定,当时即感舒适,第二天疼痛明显减轻,隆起变低,充血不明显。第三天疼痛消失,原隆起处变平坦,压耳屏及牵拉耳廓时无疼痛。

体会 苍耳子虫主治疔疮恶毒在《本草纲目》中就有记载,我们从临床观察认识到,苍耳子虫治疗耳鼻疖肿,初期未成熟时,可消肿止痛;已成熟未溃破时,能促其溃破;已溃破时能提脓促进愈合。冰片也有清热解毒之作用,加入苍耳子虫中,能增强消炎的作用,故疗效更佳。总之,苍耳子虫治疗耳鼻部疖肿,效果好,药源广泛,无副作用。在农村基层医疗中很适用。

手掌穴位封闭治疗顽固性剧烈头痛

海军旅顺疗养院 李忠良

笔者自1978年以来采用手掌穴位封闭治疗偏头痛 9 例,丛集性头痛 6 例,三叉神经痛 2 例,共计 17 例(其中男14例、女3例),均取得满意效果。

治疗方法 根据中医缪刺理论,左侧头痛取右手掌,右侧头痛取左手掌,全头痛取左右均可或双手掌。封闭部位皮肤常规消毒后,取 2% 的普鲁卡因

4 ml(先做过敏试验),用 6 号注射针头,从掌面距第4、5指间联合近心端 2 cm 处进针。针头与手掌呈 45° 角向近心端封闭,进针 3 cm 深,边进针边推药,将药液均匀地注入 4、5 掌骨间的软组织中。除局部有暂时麻木外无其他不适,如一次不愈,可重复给药。

典型病例 例 1:王×,男,23岁,战士。患右侧顽固性剧烈偏头痛 30 余天。每日上午右侧头痛发作,剧痛难忍,并有恶心、呕吐,持续约 2~3 小时缓解。住某医院神经科用多种镇痛药及中药、针灸、理疗等各种疗法,不见效果,疼痛不止。用本疗法在左手掌封闭,推药后针尚未拔出,右侧头痛即止,头清眼亮,明显轻松,1次即愈。随访 6 年未复发。

例 2:姜×,女,36岁,干部。左侧太阳穴及左眼眶周围剧烈跳痛半月,夜间和晨起时疼痛明显加重,难以忍受,白天及站立时疼痛较轻。服用盐酸麦角胺疼痛能暂时缓解,其他止痛镇静剂、理疗、针灸均无效。诊断:丛集性头痛(组织胺性头痛)。用本疗法在右手封闭 1 次当时左头痛停止,随访 5 年未复发。

体会 本疗法能立即止痛,解除患者的痛苦。笔者治疗 17 例顽固性剧烈头痛,12 例 1 次治愈,其余 5 例又分别经过 2~5 次重复封闭治疗后痊愈。各种头痛均有效(但器质性头痛要进行病因治疗)。手掌穴位封闭疗法是门诊医生能立即缓解病人头痛确实有效的好办法,值得试用推广。其作用机理尚不清楚,有待今后进一步研究和探讨。

中西药结合治疗男性乳房发育症 118 例临床观察

辽宁省绥中县医院 王修环

男性乳房发育症是较常见的一种病症,自1973年2月~1985年2月,笔者在单独应用西药治疗本病无效情况下,采用中西药结合治疗男性乳房发育症,效果满意,报告如下。

一般资料 本组 118 例男性乳房发育症皆在门诊治疗。14~25岁 87 例,26~63岁 31 例;病程 1~3 个月者 66 例,4~6 个月者 25 例,7~12 个月者 21 例,一年以上者 6 例。

治疗方法 柴胡 15g 白芍 15g 白术 15g 云苓 15g 香附 20g 丹参 15g 王不留行 15g 鸡血藤 20g 水煎服。儿童酌减。如有混合感染加双花、连翘、地丁、公英等清热解毒药。肿痛严重者加桃仁、红花、