

大黄、生地之类，也有利尿止血和抗菌作用。再鼓励病人多饮糖水，配合扩容，碱化尿液等，保持一定尿量，从而促使肾功能恢复，又利排毒，相得益彰。呼吸肌麻痹也是其主要并发症，一旦自主呼吸停止，药物治疗往往无效。只有通过气管切开和人工辅助呼吸才能救治，但必须及时准确地掌握时机。由于病人中毒严重，多伴肝肾功能损害。在自主呼吸停止前必有一先兆症候群：烦躁，头额汗出如油，牙关紧，呼吸困难，胸式呼吸浅促或消失，腹式呼吸减弱，节律不整，唇甲紫绀，四肢厥冷，血压骤升等，应视为气管切开的指征。术后仍需解毒排毒，益气生脉和抗感染，注意保护肾功能和水与电解质平衡。加强护理，配合针灸，促使自主呼吸早期恢复。总之，蝮蛇咬伤的救治并不困难，关键在于“早”。要估计中毒程度，采取防治措施，密切观察呼吸、脉搏、血压和尿量尿色的变化，就能提高救治成功率。

## 三草三根汤治疗慢性乙型肝炎 50例疗效观察

中国人民解放军白求恩国际和平医院传染科  
李藻新 郭桂华 吕风珍 王发应 王锡育

1984年以来，我科应用三草三根汤治疗慢性乙型肝炎，取得了比较满意的效果，报告如下。

**一般资料** 诊断按1983年第二届全国传染病与寄生虫病专题学术会议(郑州)通过的《病毒性肝炎防治方案》慢性肝炎的诊断标准确诊。慢性迁延性肝炎(CPH)45例，慢性活动性肝炎(CAH)5例。男48例，女2例。年龄11~61岁。以20~40岁为最多共44例，占88%。病程6个月~1年21例，1~3年22例，3年以上者7例，最长的13年。50例HBsAg阳性(RPHA法)。

**治疗方法** 三草三根汤：白花蛇舌草15~30g、夏枯草12~15g、甘草6~12g、板蓝根10~15g、山豆根10~15g、白茅根15~30g。每日一剂水煎分两次服。疗程2~3个月。维生素C200mg，酵母0.9g每日2次，恶心呕吐不能进食者，10%葡萄糖600ml每日一次静点10~15天。每隔10~15天查肝功能，HBsAg一次。

**结果** 一、疗效判定标准：(1)临床近期治愈：自觉症状消失，各项肝功能检查恢复正常，肝脾肿大缩小，无明显的压痛及叩击痛。(2)好转：主要症状

体征好转，SGPT、SGOT、TTT、ZnTT均下降，HBsAg滴度下降者。(3)无效：与治疗前比无变化。

二、疗效：临床近期治愈33例(66%)，好转12例(24%)，无效5例(10%)。总有效率90%。50例中HBsAg复查3次连续阴性12例，占24%；HBsAg滴度明显下降17例，占34%。总有效率58%。

**体会** 本方剂具有清热解毒，消炎利胆退黄；防止肝细胞坏死，促进肝细胞再生作用。对改善症状、体征，降酶效果较好。经临床应用，安全可靠，药源丰富，价格便宜，个别患者服后有口苦，咽干，尿黄，但停药后很快消失，未见其它副作用。

## 姜黄九物汤治疗输精管结扎 术后并发症48例

湖北省鹤峰县中医院 黄采芹

笔者在1983年以姜黄九物汤治疗输精管结扎术后的并发症(即感染与痛性结节)48例，临床应用取得较好效果，现报告如下。

**诊断标准** (1)感染：多在术后7~10天内在伤口部位红肿，热痛，以及睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺及精索等发生炎症。(2)痛性结节：一般在术后一月左右发生，在局部出现直径1~1.5cm的结节，有轻度疼痛，压之更甚，排尿时有坠胀感，并有1/2的患者伴有腰痛。

**一般资料** 本组48例患者均系男性，最大年龄43岁，最小年龄23岁，平均年龄30.5岁。术后7~15天内发病，有少数患者在一月左右发病。其中局部感染19例，痛性结节29例，伴有腰痛者21例，伴有排尿困难者7例。

**治疗方法** 药物组成：姜黄片30g、当归20g、鸡血藤15g、生黄芪15g、金银花20g、大青叶30g、白花蛇舌草30g、蚤休10g、元胡10g。伴有腰痛者加桑寄生30g、川六汗10g，伴有排尿困难者加茯苓20g、淮木通6g，每剂1.5剂水煎服，6天为一疗程。忌辛辣食物，房事。

**结果** 48例患者中46例均在15天~1月内临床自觉症状消失，2例症状缓解好转。用药最多12剂，最少6剂。治疗有效率达95.8%，好转率4.2%。

**体会** 本方由三类药物组成，一以补气血、扶正祛邪为主，二以清热解毒为辅，三以活血、止痛为佐使。如黄芪、当归，益气补血推动血运提高机体抗病