

大黄、生地之类，也有利尿止血和抗菌作用。再鼓励病人多饮糖水，配合扩容，碱化尿液等，保持一定尿量，从而促使肾功能恢复，又利排毒，相得益彰。呼吸肌麻痹也是其主要并发症，一旦自主呼吸停止，药物治疗往往无效。只有通过气管切开和人工辅助呼吸才能救治，但必须及时准确地掌握时机。由于病人中毒严重，多伴肝肾功能损害。在自主呼吸停止前必有一先兆症候群：烦躁，头额汗出如油，牙关紧，呼吸困难，胸式呼吸浅促或消失，腹式呼吸减弱，节律不整，唇甲紫绀，四肢厥冷，血压骤升等，应视为气管切开的指征。术后仍需解毒排毒，益气生脉和抗感染，注意保护肾功能和水电解质平衡。加强护理，配合针灸，促使自主呼吸早期恢复。总之，蝮蛇咬伤的救治并不困难，关键在于“早”。要估计中毒程度，采取防治措施，密切观察呼吸、脉搏、血压和尿量尿色的变化，就能提高救治成功率。

三草三根汤治疗慢性乙型肝炎 50例疗效观察

中国人民解放军白求恩国际和平医院传染科
李滌新 郭桂华 吕凤珍 王发应 王锡育

1984年以来，我科应用三草三根汤治疗慢性乙型肝炎，取得了比较满意的效果，报告如下。

一般资料 诊断按1983年第二届全国传染病与寄生虫病专题学术会议(郑州)通过的《病毒性肝炎防治方案》慢性肝炎的诊断标准确诊。慢性迁延性肝炎(CPH)45例，慢性活动性肝炎(CAH)5例。男48例，女2例。年龄11~61岁。以20~40岁为最多共44例，占88%。病程6个月~1年21例，1~3年22例，3年以上者7例，最长的13年。50例HBsAg阳性(RPHA法)。

治疗方法 三草三根汤：白花蛇舌草15~30g、夏枯草12~15g、甘草6~12g、板蓝根10~15g、山豆根10~15g、白茅根15~30g。每日一剂水煎分两次服。疗程2~3个月。维生素C200mg，酵母0.9g每日2次，恶心呕吐不能进食者，10%葡萄糖500ml每日一次静点10~15天。每隔10~15天查肝功能、HBsAg一次。

结果 一、疗效判定标准：(1)临床近期治愈：自觉症状消失，各项肝功能检查恢复正常，肝脾肿大缩小，无明显的压痛及叩击痛。(2)好转：主要症状

体征好转，SGPT、SGOT、TTT、ZnTT均下降，HBsAg滴度下降者。(3)无效：与治疗前比无变化。

二、疗效：临床近期治愈33例(66%)，好转12例(24%)，无效5例(10%)。总有效率90%。50例中HBsAg复查3次连续阴性12例，占24%；HBsAg滴度明显下降17例，占34%。总有效率58%。

体会 本方剂具有清热解毒，消炎利胆退黄，防止肝细胞坏死，促进肝细胞再生作用。对改善症状、体征，降酶效果较好。经临床应用，安全可靠，药源丰富，价格便宜，个别患者服后有口苦，咽干，尿黄，但停药后很快消失，未见其它副作用。

姜黄九物汤治疗输精管结扎 术后并发症48例

湖北省鹤峰县中医院 龚采芹

笔者在1983年以姜黄九物汤治疗输精管结扎绝育术后的并发症(即感染与痛性结节)48例，临床应用取得较好效果，现报告如下。

诊断标准 (1)感染：多在术后7~10天内切口部位红肿，热痛，以及睾丸、副睾、输精管、精囊、前列腺及精索等发生炎症。(2)痛性结节：一般在术后一月左右发生，在局部出现直径1~1.5cm的结节，有轻度疼痛，压之更甚，排尿时有坠胀感，并有1/2的患者伴有腰痛。

一般资料 本组48例患者均系男性，最大年龄43岁，最小年龄23岁，平均年龄30.5岁。术后7~15天内发病，有少数患者在一月左右发病。其中局部感染19例，痛性结节29例，伴有腰痛者21例，伴有排尿困难者7例。

治疗方法 药物组成：姜黄片30g 当归20g 鸡血藤15g 生黄芪15g 金银花20g 大青叶30g 白花蛇舌草30g 蚤休10g 元胡10g。伴有腰痛者加桑寄生30g、川六汗10g，伴有排尿困难者加茯苓20g、淮木通6g，每日1剂水煎服，6天为一疗程。忌辛辣食物，房事。

结果 48例患者中46例均在15天~1月内临床自觉症状消失，2例症状缓解好转。用药最多12剂，最少6剂。治疗有效率达95.8%，好转率4.2%。

体会 本方由三类药物组成，一以补气血、扶正祛邪为主，二以清热解毒为辅，三以活血、止痛为佐使。如黄芪、当归，益气补血推动血运提高机体抗病

能力。银花、大青叶、白花蛇舌草、蚤休清热解毒，抗感染，促进组织修复再生，姜黄、元胡、鸡血藤得补气血之药力，进一步增强活血化瘀止痛的效能。三类药物合用，各发挥其所长。补气不易留瘀，祛瘀而不伤正，从而达到相互促进，诸症痊愈。

麝香回阳膏药加莱菔子穴位敷贴 治疗术后腹胀气、尿潴留30例

湖北黄石市中医院 刘仁勇

从1981年12月~1983年4月作者对本院伤外科、痔瘘科两个病区的术后腹胀气、尿潴留30例应用“麝香回阳膏药”加莱菔子穴位敷贴，疗效较好。

一般资料 30例中，男性23例，女性7例。其中腹部手术后并发腹胀气者16例，腰麻、局麻后行下肢骨科手术、枯痔术以及截瘫病员所致尿潴留者14例。术后腹胀时间最长5天，最短3天。尿潴留时间最长28小时，最短12小时。

治疗方法 麝香回阳膏药系天津红旗制药厂产品，主要成份有麝香、冰片、乳香、没药、儿茶、血竭等。使用时将药膏放入温开水中浸泡1分钟（切忌火烤，以免炭化）。然后取出捏成薄片，再加入去壳的莱菔子一勺放入膏药中心，敷贴于神阙（肚脐）穴处，记录时间，观察疗效。

结果 肛门排气：快者30分钟，慢者4小时，一般2小时。排尿：快者35分钟，慢者3小时，40分钟以内排尿的有8例，1~1½小时排尿的有4例。治疗后达到排气的有15例，排尿的有12例，无效3例。

讨论 麝香回阳膏药主治腰痛、搭背、对口、烫伤等症。加莱菔子后敷贴于具有温肾通阳、气化行水的神阙穴处，用来治疗术后出现的腹胀、尿潴留，取得满意的效果。究其原因，可能与性味辛香，善于走窜，具有回苏醒神，通窍开闭的麝香和芳香开窍，辛凉散郁的冰片及消食化积，行滞除胀的莱菔子等药物作用有关。由于局部敷贴后，刺激皮肤感受器，反射性促进肠蠕动和膀胱功能的恢复，从而达到排气、排尿的目的。

本疗法简便、经济，除孕妇外均可应用。但脊柱损伤合并截瘫或椎管内肿瘤引起大便不通、小便潴留者，麝香膏敷贴则无效。本文介绍无效的病例其中有2例属于上述情况。对于痔疮术后出现的尿潴留，用

麝香膏虽能排尿，但同时也能排气，可致痔脱出，应选择应用。

复方白芨煎灌肠治愈轻型慢性非特异性溃疡性结肠炎6例

锦州市205医院 李吉茹 孙福山

笔者从1972年起，采用复方白芨煎灌肠法治疗6例轻型慢性非特异性溃疡性结肠炎，全部治愈，报告如下。

一般资料 6例中男性3例，女性3例；年龄31~40岁2例，41~45岁4例；病程2年1例，3年2例，4、5和6年各1例。6例全为轻型，其中寒湿型4例，湿热型2例。临床表现：6例均为脓血及粘液便，日2~4次，左下腹痛下坠、压痛，里急后重，肠鸣音亢进，大便培养及镜检三次均为阴性，乙状结肠镜检查均见肠粘膜溃烂，周围充血和水肿。寒湿型均舌胖淡、苔白腻，脉沉迟缓，湿热型均舌红、苔黄腻，脉滑数。

诊断及疗效判定标准 诊断均以《实用内科学》的内容为依据，疗效判定方法为：治愈：症状、体征及内窥镜检查结肠炎变和溃疡均消失；好转：症状、体征及内窥镜检查均有改善，但未全部消失；无效：三个疗程后，症状、体征及内窥镜检查与治疗前对照均无变化。

治疗方法 白芨15g，寒湿者加桂枝15g、艾叶炭15g，湿热者加槐花20g、地榆20g，白芨为面，将余药煎汤取200ml，与白芨面混合搅匀，待药液温度在38℃左右时保留灌肠，灌前将患者臀部垫高，尽量使药液在体内保留2小时以上，每日一次，三周为一疗程，休息一周并复查，无效继续新疗程。

结果 6例全部治愈，1个疗程治愈者1例，2个疗程治愈者3例，3个疗程治愈者2例，平均治愈时间2.15疗程。全部病人治疗过程中，未发现任何副作用和不适反应。

体会 复方白芨煎灌肠治疗慢性非特异性溃疡性结肠炎，主药白芨收敛止血，消肿生肌，可促使溃疡愈合，并采取中医辨证分型方法，寒湿型选加桂枝及艾叶炭温经散寒止血，湿热型选加槐花及地榆清热凉血止血，诸药相合，使药物直达病所，既针对病因，又促其局部病变愈合，因此加速疾病之痊愈，本法简便效果好，无痛苦和副作用。