

中药药疹及其探讨

同济医科大学附属协和医院皮肤病学教研室 曾昭明

本文报道因应用中药发生药疹者 12 例,其中男 10 例,女 2 例,年龄 2~70 岁,从开始用药到发疹时间为 4 小时~4 天。临床表现详见附表。

讨论 一、中草药已广泛用于临床,有良好效果,然而发生药物反应或药疹者日趋增多,其发病率占整个药疹的 0.75~3.08%^(1,2),有报道应用地方中

附表 12 例中药药疹病例简介

病 例	用 药	应 用 中 药	情 况	临 床	表 现	初发皮 疹时间	药疹类型
原因	药 物 名 称	用法用量	主 要 症 状	皮 损 情 况			
1	预防中暑	菊花、麦冬、芦根、玄参、竹叶、荆芥、山楂、甘草	开水泡服 500 ml	皮肤灼热作痒,头晕心慌,腹痛便稀,体温38.8℃	风团泛发于全身,口唇眼睑明显水肿,眼结膜微充血	4 小时	荨麻疹型△
2	手指感染	银花、白芷、大贝母、天花粉、乳香、没药、山甲、防风等	煎服 4 剂	肤痒作燥,头晕神疲,体温38.3℃	风团,有的融合成大片,下肢为甚,两眼睑水肿显著	4 天	荨麻疹型
3	视网膜炎	防风、荆芥、白芷、银花、丹参、黄芩、谷精草、板蓝根等	煎服 2 剂	头面部作热,全身肤痒	头、颈、前胸部为弥漫性红斑,压之退色,其他部位红斑甚少	2 天	猩型△
4	腰痛	独活寄生丸*	口服120g	肤痒作燥	弥漫性红斑,压之退色,躯干股部为甚,他处散在	4 天	猩型
5	腰扭伤	跌打丸*	口服 2 丸	皮肤灼痒,心烦口干,喜冷饮	弥漫性红斑,压之退色,前胸大腿皮损为甚	10小时	猩型
6	坐骨神经痛	白花蛇、马钱子、钻地风、老鹳草、补骨脂、麻黄、黄芪、苍术等	煎服 1 剂	肤痒身燥	风团泛发于全身,躯干大腿处融合成大片	1 天	荨麻疹型
7	感冒	感冒茶*	口服半袋	肤痒作燥	风团泛发全身	6 小时	荨麻疹型
8	咽痛	喉痛解毒丸*	口服 1 盒	患处灼热疼痛并发痒	阴茎、龟头水肿、冠状沟处有成片糜烂渗液	3 天	固定型△
9	右侧肢体偏瘫	大活络丸* 三七药酒*	口服 1 盒 250 ml	肤痒	风团和红色丘疹,颈周腰部及四肢为甚	4 天	荨麻疹型
10	延年益寿	灵芝御液酒*	口服200ml	肤痒作燥	大片弥漫性红斑,压之退色,躯干、颈部为甚,四肢偏少	2 天	猩型
11	补虚健身	中药酒(三七、海马、红花、乌梢蛇等)	口服15ml	全身灼热肤痒,头晕眼花心慌,腹痛便稀,身汗出	风团和红色斑丘疹,躯干下肢居多,眼结膜微充血	4 小时	荨麻疹型
12	足癣	黄连素注射液*	肌肉注射 8 ml	肤痒,头晕心慌,神疲肢软	全身泛发风团,四肢为多	10小时	荨麻疹型

* 为市售成药。△荨麻疹型,猩红热样型,猩红热样红斑型,固定型—固定性药物疹型

草药出现药疹者可高达 12.32%⁽³⁾,所用中药剂型有用汤剂、酒制剂、针剂以及中成药等。本文病例均排除了因用西药或同时用中西药而致药疹的可能性,包括不同的中药剂型及用药途径,因此具有一定的代表性。

二、中药药疹的临床症状:皮肤瘙痒是常见主症之一,本文 12 例均有此症,然而也并见一些头晕、心慌等症,其中 2 例有全身发热,1 例为药物热,另者因手部感染,其发热原因尚难分辨。2 例伴有眼结膜充血。全部病例均用西药治疗,分别为 2~21 天转愈。

三、本文病例所服之中药,均为常用,用量也未超常,其发病多因患者对所用之中药或其代谢产物而发生了过敏现象。因此,医生在用药之前宜先了解患者有否过敏史或变态反应性疾病,并在用药期间多加

以观察。

四、本文 12 例,除 1 例外均为多味复方,若采用直接激惹试验来探明其中某味或多味药物致敏,以戒其后,无疑是有益的,但对病者可能导致药疹再发,并有一定的危险性,故笔者慎而未从。

(本文承我室祝兆如副教授审阅,谨致谢意)

参 考 文 献

1. 安徽医学院皮肤性病教研组. 药物性皮炎 400 例病案分析. 安徽医学院学报 1960; 3 (5): 466.
2. 杨国亮. 909 例药疹的临床分析报告. 上海第一医学院学报 1965; 3 (3): 283.
3. 云沛霖. 203 例药物性皮炎初步观察. 中华皮肤科杂志 1965; 11 (2): 108.