

16. 王泰东, 等. 双睾切除术并用中药温阳利水治疗前列腺肥大症38例临床分析. 中西医结合杂志1985; 5(1): 36.
17. 苗聘三. 加味桂枝茯苓丸治疗前列腺肥大引起尿潴留. 河南中医1983; 3: 31.
18. 沈楚翘. 中医治疗前列腺增生症和前列腺炎的经验体会. 辽宁中医杂志1981; 5: 29.
19. 孙宜安, 等. 中药颠倒散治愈癃闭证. 辽宁中医杂志1980; 6: 48.
20. 陈若平. 垂杨柳嫩根治癃闭. 浙江中医杂志1984; 9: 397.
21. 叶华林. 五苓散加鲜菖蒲根治前列腺肥大尿潴留. 浙江中医杂志1984; 9: 397.
22. 何懋生. 木鳖子治癃闭20例临床观察. 浙江中医杂志1984; 9: 397.
23. 大村泰治郎. 前列腺肥大患者治疗. 日本第31回东洋医学会学术总论文集1979; 4: 16.
24. 小岛大谷. 猪苓汤合桂苓丸作前列腺术后维持剂效果观察. 日本东洋医学杂志1982; 6: 119.
25. Paulson DF, et al. Medrogestone: a prospective study in the pharmaceutical management of benign Prostatic hyperplasia. J Urol 1975; 113: 811.
26. 吴阶平, 等. 泌尿外科学进展. 上海: 上海科技出版社, 1966: 434.
27. 谢正华. 前列腺癌7例报告. 中华泌尿外科杂志1982; 3(3): 219.
28. 梅 骅. S.3378 对前列腺增生的疗效观察. 广州地区医药卫生学术报告资料1977: 9.
29. Fam A. Non-operative management of senile prostatic hyperplasia. J Urol 1972; 107: 1022.
30. Caine M, et al. Adrenergic and cholinergic receptors in the human prostate, prostatic capsule and bladder neck. Brit J Urol 1975; 47: 193.
31. Caine M, et al. A placebo-controlled double-blind study of effect of phenoxybenzamine in benign prostatic obstruction. Brit J Urol 1978; 50: 551.
32. Gordon HW, et al. The effect of polyene macrolides on the prostate gland and canine prostatic hyperplasia. Proc Nat Acad Sci of the USA 1968; 60: 1201.
33. 上海医药工业研究院抗菌素室. 克念菌素治疗前列腺增生资料汇编. 上海: 上海医药工业出版社, 1977: 2.
34. Abrams PH. A double-blind trial of the effects of candicidin on patients with benign prostatic hypertrophy. Brit J Urol 1977; 49: 67.
35. 吴大兰, 等. 注射疗法治疗前列腺增生症100例. 中华外科杂志1979; 17(4): 262.
36. 夏金生, 等. 注射疗法治疗前列腺增生症120例. 中华外科杂志1982; 3: 216.
37. Choudhury A, et al. Evaluation of the role of injection therapy for benign prostatic hypertrophy. Brit J Urol 1980; 52: 204.
38. 史时芳. 前列腺冷冻疗法. 国外医学外科分册1979; 6(2): 81.
39. 二氧化碳激光治疗前列腺增生. 广东医学1983; 4(1): 44.
40. Person RM & Noe HN. Propranolol therapy for uroclepsia of operation of benign prostatic hypertrophy. Geriatrics Jan 1969; 43: 18.
41. Ghanadian R, et al. Suppressive effects of surgical stress on circulating androgens during and after prostatectomy. Brit J Urol 1981; 53: 147.
42. 奥田拓道, 等. 八味地黄丸的药理研究. 汉方研究1982; 4: 160.
43. 村人泰秀·他. Prostatin 对前列腺肥大的疗效. 老年医学杂志(日文)1983; 21(10): 131.

口服生大黄粉治疗高脂血症30例

辽宁省中医研究院 于世家

笔者于1984年11~12月对30例高脂血症(单纯胆固醇升高者9例, 单纯甘油三酯升高者18例, 两者均升高者3例)治疗均选用生大黄粉装胶囊, 每粒0.5g, 每日1~2次, 每次1粒饭后即服, 服药期间停服其它降脂药物, 饮食如常(不特殊限制脂类饮食摄入), 疗程一个月, 服药前后分别复查血脂。结果, 甘油三酯平均下降88.4mg/ml, 胆固醇平均下降48.8mg/ml, 服药后除见大便次数增多外, 未见其它不良反应。作者认为, 口服生大黄粉降脂, 安全有效且价廉。若用量减至每日0.5~1g, 分1~3次服用后上述大便次数增多的副作用则消失。至于大黄的降脂作用机理, 有待于进一步探讨

应用仙鹤草治疗美尼尔氏病42例

吉林省双辽县医院 刘继增

一般资料 本组男19例, 女23例, 年龄20~53岁。

诊断依据 突然眩晕、耳鸣, 恶心呕吐, 听力障碍, 眼球震颤, 除外其它疾病。

治疗方法 仙鹤草100克水煎, 每日一剂, 分二次服。

疗效 42例均治愈(临床症状全部消失, 追踪观察三年未复发。治愈时间为1~6日, 平均3.2日。应用仙鹤草治疗美尼尔氏病未发现副作用, 方法简便价廉, 特此报道, 为今后研究提供一线索。