

部穴位，隔日或3日1次，两耳交替，5次为1疗程，视情况治疗1~3疗程。主穴为脑点、膀胱、肾、支、兴奋点；配穴为肺、脾、三焦。共治疗15例，年龄4~15岁，病程3~15年，一般从接受耳压疗法的第一天开始即无遗尿现象。有的患者在治疗前常在梦中小便，醒来已遗尿，治疗后已无梦尿现象；有的并能自己醒来小便。

## 注射用水痛点皮内注射 治疗肾绞痛 100 例疗效观察

武汉市第八医院 刘宛华 陈 斌

本组患者X线尿路平片检查示多发性结石6例、肾结石14例、输尿管结石54例、X线不透光结石26例。绞痛发作时常伴有恶心呕吐、排尿异常及血尿等，腰部相应部位常有1~2个明显的压痛点。均以注射用水作痛点皮内注射方法治疗，每次注射0.5~1ml，以局部皮肤呈桔皮样改变，皮丘直径1.5~2cm为宜；少数压痛点不明显者，可在与疼痛部位相对应的体表取穴注射。结果：注射20分钟内疼痛消失者76例，疼痛减轻并可忍受者16例，无效8例。多数患者经一次治疗即完全止痛且未再复发，少数有反复者再次注射仍有效。观察到压痛点越明显，注射时锐痛越强者，疼痛缓解也越显著；注射形成的皮丘直径太小、注射时出现的锐痛过弱，均可影响止痛效果。曾用普鲁卡因或玄胡川楝注射液作痛点皮内注射治疗，其镇痛效果均不及注射用水。

## 中药治疗扁平疣30例疗效观察

四川巴中县医院 尹绍明

1984~1985年用中药治疗扁平疣共30例，其中男16例，女14例；年龄8~31岁；病程<1月~6月；面部扁平疣28例，下肢扁平疣2例。药用板蓝根、大青叶、牡蛎各31g，紫草、郁金、桃仁、红花各9g，苡仁、桑白皮各12g，共煎4次，取汁混合约得1,000ml。每日服2次，每次300ml；其余400ml用作擦洗患处及湿敷。擦洗患处的次数不限；湿敷于睡前进行，取相当于病损大小的纱布4~6层浸透药汁敷2小时。每日用药1剂，结果病损在面部者全部有效，有的用药3剂即获痊愈，一般用药6剂见效；但病损在下肢者2例用药2周仍无效。

## 中药香附、木贼外洗 治疗青年扁平疣

——附2例报告

安徽省临泉县人民医院 李金科

治疗方法：取香附、木贼各约200g加水1500ml，煮沸，过滤，待不太烫时以小毛巾浸药液洗涤患处，边洗边揉，亦可用作湿敷，以促使药液向疣组织内渗透，使疣的体积膨胀，疗效更好。每日洗涤1~2次，每次约半小时；每剂药可连用3~4次，疣体消失后一般不留任何痕迹。

病案举例：例1，女，24岁，三年前发现面部生长出大小不等、凸出皮面的淡褐色扁平疙瘩，初起少而小，以后逐渐增多，有的相互融合，色素加深，抚摸有粗糙感或异感。诊断为青年扁平疣，按上法外洗8次而愈，随访无复发。例2，男，26岁，1977年面部生长许多暗红色扁平疙瘩，次年更见增多，主要分布于额部、颌面，呈大小不均、疏密相间呈淡褐色，有痒硬感，诊断为青年扁平疣，1979年按上法治疗半月而愈，随访至今无复发。

## 连翘败毒丸治疗急性 荨麻疹18例报告

内蒙古巴盟医院中医科 温治江

本组18例均为成年人，来诊前大多未经任何治疗，除2例因服用止痛药引起者外，其余原因不明。均治以内服连翘败毒丸，每次2丸，日服2~3次，忌食鱼虾及辛辣食物。连翘败毒丸含连翘、金银花、大黄、桔梗、甘草、木通、防风、元参、赤芍、白芍、黄芩、浙贝母、紫花地丁、蒲公英、栀子、白芷、天花粉、蝉蜕等。结果：痊愈11例，好转3例，无效（服药3天后无任何变化）4例。本药对急性荨麻疹偏风热者效果较好，对身体健壮、舌红、脉数、便秘者尤其有效；对慢性及偏风湿者无效。

## 中西药内外并用治疗酒渣鼻79例

山东省济宁市皮肤病防治院门诊部 杨泗奎

酒渣鼻又称红斑性痤疮。本组79例患者中，男60例，女19例；年龄25~50岁；病程30天~20年；属红斑期50例，丘疹脓疮期20例，鼻赘期9例。

治疗方法：（1）内服三黄栀子汤为主，本方含大