

88.5%，而对照组为 43.3%，治疗组明显优于对照组。实验证明小儿止泻散有多种维生素、微量元素，对肠蠕动有抑制作用，并可促进小肠吸收，调整菌群失调。这次会议对小儿疳症及厌食症的研究有明显增多。上海医科大学儿科医院应用益气健脾利湿法为主治疗小儿疳症 52 例，总有效率为 98%，治疗后血锌有明显升高，血铜、锰改变不大，证实健脾益气化湿中药对疳症有较好的疗效。中国中医研究院广安门医院应用强壮灵治疗 62 例厌食症，总有效率达 90.3%。动物实验表明强壮灵可增强巨噬细胞吞噬能力，其含酶量也明显加多。

泌尿系统疾病

较多的论文是有关急性肾炎的研究。北京友谊医院应用当归注射液治疗急性肾炎，与对照组比较治疗组有效率为 87.5%，而对照组为 75% ($P < 0.05$)，血小板聚集率异常也较对照组恢复快。动物实验应用麻苗引起肾病变，给与当归后肾毛细血管腔内血小板聚集、红细胞瘀滞、白细胞阻塞现象消失，肾小球毛细血管损伤及肾曲小管结构也恢复正常。福建省立医院儿科用中医辨证治疗急性肾炎 599 例，治愈率为 95.8%，测治疗前后抗 O、C₃、C₄、抗核抗体、CIC 等提示中药对溶血性链球菌感染后的免疫反应可能有一定的抑制作用。浙江杭州中西医结合医院用东莨菪碱 0.01~0.02mg/kg，静脉滴注加中医辨证治疗 16 例急性肾炎肾功能不全有较好的疗效，利尿时间平均为 3.4 天，浮肿消退平均 8 天，认为东莨菪碱有疏通肾微循环的作用。上海医科大学儿科医院应用雷公藤治疗小儿各型肾小球疾病 48 例，平均疗程 3.09 月，结果近期缓解占 66.7%，总有效率 87.5%。肾活检病理改变与疗效的关系表明系膜增生性及膜性肾病疗效较好，对局灶硬化性肾炎及膜增生性肾病疗效较差。副作用有皮疹、白细胞低下及胃肠道症状等。陕西省中医药研究院对西安市 17 所小学调查遗尿症发病率平均为 10.72%。将 252 例小儿遗尿症分为中药组、中西医

结合组、激光组及西药对照组，结果中药组与激光组疗效优于西药组。

其他疾病

广州市儿童医院治疗散发性脑炎 87 例，采用复方毛冬青（毛冬青、大青叶、板蓝根）加地塞米松静滴，重症病例加服按温病学辨证施治方药，结果痊愈率 72.4%，好转 18.4%，无效 2.3%，死亡 6.9%，病死率较国内报道要低，经病毒学检测证明一部分散发性脑炎与病毒直接感染有关，而病毒是多源性的。同济医科大学附属同济医院采用茵栀黄注射液与激素治疗组对照治疗婴儿肝炎综合征 40 例，两组病程及病情相同，结果茵栀黄组疗效明显高于激素组，其退黄、降 SGPT 效果良好，且长期使用极少发现不良作用。上海市儿童医院用复方丹参静滴及口服大黄治疗新生儿及婴幼儿坏死性小肠结肠炎 27 例，有 19 例治愈，2 例好转，1 例未愈，5 例死亡，病死率 18.5%，与同期单用西药治疗 17 例病死率 58.3% 比较有明显疗效。江西中医学院儿科应用东莨菪碱穴位注射治疗小儿瘫痪 230 例，与单用东莨菪碱肌注、丹参注射液穴位注射及针灸治疗 115 例对照，结果东莨菪碱穴位组有效率为 97.4%，与对照组比较疗效提高。实验证实其机理为调节血管功能，疏通微循环，促进破坏的脊髓神经细胞恢复，抑制神经负反馈，调节乙酰胆碱的平衡。湖南医学院一附院儿科采用川芎红花注射液对百日咳菌液所致兔脑水肿疗效研究为临床治疗血管性脑水肿提供了依据。此外各单位应用中西医结合疗法治疗小儿病毒性心肌炎、顽固性心律失常、先天性斜颈等都取得了较好的疗效。

这次交流会出现了一批有较高水平的论文，很多单位注意到对照观察及临床和实验研究相结合，从临床到实验研究都显示了近年来儿科中西医结合工作取得了可喜的成果。

（时毓民 李 贵 阎田玉整理）

• 新药介绍 •

治疗阑尾炎新药——阑尾灵冲剂

阑尾灵冲剂是黑龙江省医院与哈尔滨中药一厂合作研制的治疗各型阑尾炎的有效新药。该药配方是在收集全国 25 个省市 46 所医院发表的 82 张治疗阑尾炎处方的基础上，利用电子计算机筛选出最常用、疗效最好的药物配制而成。经黑龙江省医院、北京积

水潭医院、天津第二中心医院、河南省人民医院、西安医学院附属医院等协作临床观察，共治疗 449 例，近期治愈率达 94%。经黑龙江省卫生厅、哈尔滨市卫生局及科委组织鉴定，专家们一致认为该药处方配伍准确合理，剂型服用方便，制作工艺先进，疗效确切可靠，无毒副作用。该药目前已批量投产供临床使用。

（黑龙江省医院普通外科 杨熙平）