

不足 1/3 或基本不变, 临床症状未变, 痰菌仍阳性, 血沉未降至正常。

4. 恶化: 治疗后肺门肿大之淋巴结较治疗前增大, 临床症状未变或增多, 痰菌仍阳性, 血沉反而加快者。

5. 痰菌评定标准根据 1982 年上海全国结核防治学术会议修订标准(中华结核和呼吸系疾病杂志 1982; 5(6):381)。

二、治疗结果

1. 单用组: 治疗时间 31~454 天, 平均 120.6 天, 显效 10 例, 有效 14 例, 无效 7 例, 总有效率为 77.42%。

2. 伍用组: 治疗时间 28~345 天, 平均 127.7 天, 显效 11 例, 有效 22 例, 无效 2 例, 总有效率为 94.27%。

3. 对照组: 治疗时间 30~405 天, 平均 132.5 天, 显效 20 例, 有效 28 例, 无效 13 例, 总有效率 77.42%。

三组比较以伍用组疗效较高, 差异显著 ($P < 0.05$), 而从疗程与疗效的关系来看, 单用组及对照组从第二个疗程开始显示其疗效, 第 3~6 个疗程有效例数较多。伍用组第一个疗程结束即开始显示其疗效, 在第 2~5 个疗程有效例数较多, 因此治疗有效时间集中在 2~6 个疗程之间, 所以认为消瘰丸以 6 个疗程(即 6 个月)为最佳治疗期限, 如果疗效不佳或中途病变恶化应适时更换治疗。

三、毒、副作用: 对照组引起转氨酶升高 13 例, 胃肠道反应 1 例, 链霉素引起耳聋、耳鸣、听力减退、发热各 1 例。伍用组转氨酶升

高 2 例, 反酸减食 2 例。而单用组则未发现有毒副作用, 故认为消瘰丸是比较安全的。

四、随访观察: 单用组随访 19 例, 平均随访时间 12.5 个月, 显效 12 例, 有效 2 例, 未变 5 例; 伍用组随访 28 例, 平均随访时间 11.7 个月, 显效 10 例, 有效 5 例, 未变 12 例, 恶化 1 例。对照组随访 43 例, 平均随访 19.7 个月, 显效 24 例(含胸水吸收 1 例), 有效 9 例, 未变 9 例, 恶化 1 例。说明消瘰丸的近、远期疗效是满意的。

讨 论

消瘰丸具有滋阴潜阳、清热解毒、软坚散结的作用, 其中牡蛎、海藻、夏枯草、猫爪草, 有软坚散结之功, 专治瘰癧; 连翘、地丁能清热解毒, 玄参、泽兰叶有滋阴降火, 散结消癆, 活血通经作用。有报道(张本, 十年来有关中药在结核病方面的研究, 中国防痨 1959; 2(5):3)夏枯草、连翘还具有对结核杆菌的抑制作用, 临床应用中得到证明, 单用组痰菌阳性 4 例全部转阴。从本组统计资料来看, 对淋巴结核的疗效伍用组优于单用组及对照组, 而作用机理尚待进一步研究。

消瘰丸无毒副作用, 本组有服用长达 15 个月之久, 未见不良反应, 比较安全。本文单用组无一例发生转氨酶升高。伍用异烟肼转氨酶升高的发生频率低于对照组, 因此临床上如有肝炎患者或肝功能异常又患有淋巴结核者, 可作为首选药物。

(本文由匡铁吉同志协助特此致谢!)

中国中西医结合研究会组织专家、教授为老区人民 进行医疗咨询、义诊及科普宣传

为了支援老区的医疗卫生事业, 关心老区人民的健康, 中国中西医结合研究会不久前组织一批专家教授, 深入江西省井冈山、吉安、吉水等地, 为老区人民进行医疗咨询、义诊及科普宣传。同时为提高当地医务人员的业务水平, 举办了以内、外、儿、眼科为内容的学习班。深受当地群众和基层医务人员的欢迎和好评。

参加这次活动的有中国中西医结合研究会副秘书长危北海研究员、江西省中西医结合研究所副所长余鹤龄副研究员以及江西医学院、江西中医学院、江西医院等单位的内、外、儿、眼科的部分专家和教授。当地群众高兴地说: 专家教授不辞劳苦, 深入老区, 深入基层, 为老区人民的健康服务, 这是党对我们老区人民的关怀。

(罗兴中)