

结果：146例中治愈117例（80.1%），其中经2~3个月治愈20例，4~6个月治愈50例，6个月~1年左右治愈47例；显效8例；有效3例；无效18例。经随访观察1年复发10例。

典型病例 纪××，男，39岁。自1972年以来头部及全身毛发均脱净，经多方治疗长出绒毛毛发，不久又脱净，呈反复性普脱。各种生化检查无异常发现，于1985年3月18日来本所就诊，经用脱发再生散及生发水治疗两个月后，头部长出绒毛毛发，8个月后全身及头部毛发均长出。色黑而华泽，达到治愈标准。经随访近一年半，未见复发。

讨论 秃发病因较复杂，中医学认为“肾之华在发”，“发为血之余”，说明毛发的生长与脱落、荣润与枯槁不仅依赖于肾中精气的充养，而且还和血液的濡养有关。笔者根据这一理论自拟了脱发再生散。方中的生熟二地滋补肝肾，凉血补血；何首乌与女贞子养阴益精，乌须发；丹参、红花和全当归能活血化瘀，补血养血，安神除烦，祛瘀生新；杭白芍、川芎柔肝养风，活血搜风，引药上行；川羌活、五味子能祛风除湿，敛肺滋肾；侧柏有催发再生、去湿热之功效。

生发水中的长压定是治疗顽固性高血压病及肾性高血压病的一种降压药。有强烈扩血管作用，能直接作用于外周血管，使阻力下降。据此我们推测，长压定与乙醇和二甲基亚砷溶液混合使用，可加强对局部皮肤浸透作用，扩张脱发区的皮下血管，增加该处的血流量，改善局部毛乳头营养，进而促使毛母质细胞分裂活跃，使脱去的毛发获得再生。临床实践证明，采用本方治疗脱发疗效好，无毒副反应，值得推广使用。

点压阿是穴治疗早期乳腺炎

安徽省灵璧县中医院 吴树全

乳腺炎属中医乳痛，是哺乳期妇女常见病之一。笔者在家传点肘通乳的启示下，“循经取穴以痛为腧”，按摩治疗早期乳腺炎35例，现小结如下。

一般资料 全组35例，年龄最小19岁，最大30岁，平均年龄23岁。发病距就诊时间最短4小时，最长12天，以2天内最多。发病部位左侧12例，右侧20例，双侧3例。

治疗方法 按照经络学说，根据病在上取其下，病在左取其右的原则，即在病变部位远端选穴。右侧乳腺炎选左肘关节中间上下方，亦即手厥阴心包经，臂中与肱中穴之间寻找敏感点（触及敏感点，患者有抽

动感）即阿是穴，当有几个敏感点时要反复推敲触摸体会，找出主要敏感点，这是临床治愈的关键。以顺经为补，逆经为泻的手法点压（中指与食指并齐微屈，拇指抵于中、食指的末节，小指与无名指握紧，在敏感点上下点叩）约20分钟，在点压的同时嘱患者胸部放松，调整呼吸或点穴随患者一呼一吸，术者一起一伏进行。点压的重力以患者能忍受为度。大多数患者乳房肿胀剧痛感当即消失，或明显减轻（当时效果不明显时可在双肘敏感点同时点压）。有的乳汁即刻顺乳头溢出。每日一次，三次为一疗程。红肿明显者即配赤小豆粉70g、芒硝30g、冰片1g加水调成糊状外敷患处，以促进红肿消退。

结果 35例中痊愈30例，显效4例，无效1例。其中一次手法治愈12例，二次治愈13例，3~4次治愈5例。

适应症：临床以红肿剧痛，胸胁胀满，畏寒发热或寒热往来，舌红苔黄，脉弦大，局部触之可扪及实硬且觉疼痛之肿块为适应症。特别对于挤压触碰，情志因素引起者效果较佳；对于后期化脓扣之有波动者不宜用本法。早期亦不需抗生素配合治疗。

典型病例 田××，女，24岁，本院化验员。第一胎产后六个月，因举抬婴儿足踢双乳部致红肿剧痛约12小时，以右侧乳房红肿明显，并放射腋下，经用吸奶器多次吸除无效。检查：右乳头内上方呈大面积红肿剧痛，无波动，左上肢抬举时胸部疼痛，左肘关节曲泽穴上二寸处有一蚕豆大硬结即敏感点，初点按时局部疼痛难忍，约十分钟痛减，双乳绷紧肿胀感明显松弛。15分钟后左乳自行溢出乳汁，继行另侧敏感点点按约10分钟，双乳同时溢出乳汁约50ml。当即疼痛明显减轻，扪之双侧乳房柔软，右侧乳房内上方仍有鸡卵大的肿块。次日继用上述手法，当即肿块消失。三天后随访病告痊愈。

蛇黄油纱在临床上的应用

安徽省怀远县医院外科 李运毓

自1981年以来，我院用自制蛇黄油纱治疗烧伤、广泛性皮肤摩擦伤、接触性皮炎、过敏性阴茎溃烂均收到较好的效果，现报告如下。

临床资料 本组123例其中烧伤96例，男65例，女31例；年龄4个月~68岁；面积1~35%，多为Ⅰ°~Ⅱ°；有继发感染者68例。广泛皮肤擦伤9例，男7例，女2例；年龄19~43岁；创面广泛渗血与泥土砂石混粘，剧痛。接触性皮炎6例，男4例，女2例；年龄4~38岁；创面溃烂流水，痛痒难忍。过敏

性阴茎溃烂6例，年龄16~45岁；病程最短一周，最长2个月。单纯性阴茎（包皮、龟头）溃烂4例，阴茎、阴囊同时溃烂2例。

治疗方法 (1) 方药：蛇莓60g，黄连、大黄各30g，冰片少许、麻油400g。先把黄连置油中浸泡24小时后，以文火煎熬2小时左右，使之成为炭状，加入蛇莓、大黄约15分钟离火，冷却过滤，加入冰片搅拌即成蛇黄油，放入消毒纱布即为蛇黄油纱。(2) 用法：烧伤、广泛性皮肤擦伤清创后以1%新洁尔灭冲洗创面。接触性皮炎以生理盐水清洁创面。用蛇黄油纱敷贴包扎不受压，每日换药一次。创面干燥结痂后停用，行半暴露至愈。过敏性阴茎溃烂以生理盐水清洁创面后外涂蛇黄油，每日3~4次，暴露，结痂后停用。

结果 本组病例全部治愈。治愈时间：烧伤5~20天；广泛性皮肤擦伤4~7天；接触性皮炎3~6天；过敏性阴茎溃烂5~10天。

体会 本油纱药源广且价廉、制作与治疗方法简单，适应症广，无副作用，收效快，效果好。中面积烧伤、广泛性皮肤擦伤需应用抗生素。创面干燥结痂后应注意保护，勿硬性撕拉，以防损伤创面。据文献记载：蛇莓、黄连、大黄、冰片、麻油具有清热解毒、燥湿泻火，散瘀消肿，收敛消炎、祛腐生肌，润肤止痛痒及较强的抗菌作用。可降低毛细血管的通透性，改善脆性，减少体液外渗，改善组织与器官的循环与代谢。使用后创面很快干燥结痂，痛痒减轻或消失且感舒适。

新明溶液外用治疗感染化脓性伤口的体会

湖北省钟祥县中医院骨外科 易先德

我院自1982年以来先后用自制“新明溶液”治疗烧伤、烫伤、慢性湿疹溃疡及各种感染化脓性伤口近1000例，均收到满意效果，现将方法介绍如下。

方法 (1) 药物配制：取精制明矾50g，冰片1g，共研为细末，加入1000gml蒸馏水内溶化，用四层纱布过滤2次，再加入5%新洁尔灭溶液20ml即成。装瓶消毒备用。适用于一般烧伤、烫伤、慢性湿疹溃疡和各种感染化脓性伤口及渗出性分泌物较多的创面。(2) 用法：将纱布按需要剪成块或条，经高压消毒后浸泡在新明溶液中，按外科常规处理伤口后，取出纱布敷于创面，外用敷料包扎，每日或隔日换药一次。如果面积较大，且有大量渗出性分泌物，可

用“新明”纱块湿敷，保持湿润，随时更换，不必包扎。

典型病例 陈×，女，11岁。不慎右脚踩入火坑，当即脚背及踝部等处均被烧伤，在家自用狗油外敷和当地医院抗炎治疗三天，未见好转，而来我院求治。检查：右脚背及踝部肿痛，有多处大、小不等水泡，中间大水泡已破溃感染，有脓性分泌物，体温38.9℃。处理：用干净注射器抽出水泡内积液，用新明溶液清洁伤口，外敷“新明”纱块，每日换药，三天后，脓性分泌物减少，七天后伤口少许肉芽组织生长，十天痊愈。

体会 新明溶液是中西药物结合配制而成，临床应用于治疗外科各种化脓感染性伤口及渗出性分泌物较多的创面确有疗效。本方取明矾性寒，味酸涩，有止血防腐、消毒燥湿止痒敛疮之功；冰片抑菌，促进上皮生长，新洁尔灭为阳离子清洁剂，具有强烈的消毒、杀菌、灭菌作用。共奏消毒、杀菌、燥湿止痒敛疮，促进肉芽生长之目的。此方配制简单，药源广，费用低，使用方便，是基层医疗卫生单位较理想的外伤科常用药物。

鼻衄的针刺疗法

江苏省高淳县东坝西医院 张卫国

鼻衄是一常见之临床症状。笔者在二十余年临床实践中，摸索出一项“鼻衄的针刺疗法”，颇有功效，简便易行，谨供基层医疗单位同道参考。

治疗方法 针刺穴位：选少商、合谷、迎香、内关或外关。左鼻孔出血，取左侧穴位；右鼻孔出血，取右侧穴位；两侧鼻孔同时出血，则取双侧穴位。

针刺手法：(1) 学龄前儿童采用捻转强刺激，每个穴位1~2分钟，不留针。(2) 青少年和成人针刺时患者感到针刺部位或胀或麻或酸或困或触电似的感觉。一般视患者体质强弱，留针10~30分钟。留针过程中行针2~3次，每次行针1~2分钟即可。行针手法依次为捻转、提插、弹颤、搔抓。手法轻重、刺激强弱需视患者体质、病程、病情和针刺时即时反应与感受而灵活掌握。

典型病例 患儿何××，男，2岁，住院号1110。因不慎跌倒，碰伤鼻部，致局部红肿青斑，右鼻孔出血不止，虽经常规西医疗法，未见良效，遂予针刺疗法：取右侧少商、合谷、迎香、外关穴。不留针，针刺一次，半小时即止血，停用西药，第二天复针一次，治愈出院。