

钟,开始取汁混合频服,绿豆可频煎频服),连服3日。高热39℃以上西药降温无效者用安宫牛黄丸每次1粒化水灌入。

结果 治愈:治疗组20例均治愈(100%)。对照组20例治愈17例(85%),死亡3例(15%)。治疗组用番泻叶后5小时内排便6例,6~10时9例,5例重度者11~14时排便。对照组12小时排便1例,24~36小时排便12例,40~48小时内排便4例,该组较治疗组排便延长1~4倍。

治疗组高热昏迷者经西药降温无效的5例,用安宫牛黄丸1粒后,4例体温在半小时后开始下降,4小时内降至正常。1例用2粒后4小时开始下降,15小时降为正常。当体温正常后神志恍惚,继用安宫牛黄丸1/2~1粒,神志半小时清醒者4例,2小时清醒者1例。

治疗组无后遗症及并发症发生。对照组胃痛、恶心、呕吐4例(20%),头晕、指、趾麻木2例(10%),中毒性心肌炎1例(5%)。

讨论 口服农药中毒急症的抢救处理,祛除毒物刻不容缓,番泻叶通腑祛邪,使胃肠道毒物得从大便排出,快速输液、利尿,促毒由小便排出。中西药并用加灌大、小便排毒,毒物吸收得减,症状得解,排便后诸证缓解。绿豆可解诸药之毒,甘草解毒和中,两者合用能加强解毒之力。尤其是当阿托品过量出现的毒副症状与农药中毒症状错杂,一时难以辨认时,用甘草绿豆汤均可解之。使其过量的化学药品的毒副作用得到清除和缓解,并可加强解农药之毒的作用,实为两全其美。安宫牛黄丸降高温促苏醒与其具有解毒、豁痰、镇惊、开窍功效有关。

当然,足量的阿托品和早期应用复能剂是很必要的,对重症加用激素来增加血管致密性,减少渗出,减轻某些病理过程,防止肺水肿、脑水肿等并发症的发生;应用能量合剂、大量维生素保护重要脏器细胞的生理功能,防止中毒性心肌炎、周围神经炎的发生。此病病程长,维持水电解质和酸碱平衡,给高渗糖补足热量等是绝对不能忽视的。在此基础上并用中药来取长补短,是有助于提高治愈率、降低死亡率的。

复方樟脑酒治疗未溃冻疮20例观察

解放军38672部队卫生科 童太春

近两年来,我们应用复方樟脑酒治疗未溃冻疮20例,疗效显著。报告如下。

方药及用法 95%酒精100ml,樟脑10g,花椒

50g,干辣椒3g,甘油20ml。先将花椒、干辣椒用凉开水洗净,干辣椒切碎(籽勿取出),泡入95%酒精内7天,经常摇动,然后滤出;再加樟脑、甘油即成。最好先用热水浸泡患处,再用此药涂擦,面积应超过患处范围,每日外擦5至7次。

结果 本组病例发生在手部16例(其中双手6例),足部4例。面积最小约2×2cm,最大约8×8cm。涂药后患处痒、痛减轻,红肿范围随涂药次数增加逐渐缩小。经一个月后随访,20例全部治愈(皮肤正常,自觉症状消失),治愈天数7至16天,平均10天,治疗中未发现不良反应。

讨论 樟脑可止痒、散肿、活血;现代研究,樟脑含有右旋性酮,在皮肤上揉擦可引起发红,并具有轻微的局麻作用,涂于皮肤有麻木感。花椒辛热,可散寒除湿、解郁结;花椒果实含挥发油,对局部有麻醉止痛作用。辣椒辛热,亦能散寒除湿。酒精使血管扩张,血脉流通,消毒杀菌。甘油防止皮肤燥裂。以上各药均有防治冻疮功效,配合使用,疗效更佳。

尖锐湿疣的简易疗法

四川省广元市中医医院 张文雄

尖锐湿疣是一种由病毒引起的疣状赘生物,好发于外阴和肛周,临床虽有腐蚀剂涂擦、手术切除、电灼等疗法,但均需一定的治疗条件,且患者颇感不便。

15年前,笔者下乡巡回医疗时曾治一中年男性,患尖锐湿疣已半个月,病变部位在阴茎冠状沟,呈污灰色,如菜花样突起,有压迫及痒感,表面微有渗液。因地处偏远山区,无适当药物,考虑到痱子粉由氧化锌、明矾、硼酸、水杨酸、滑石粉等组成,有清洁、干燥、消炎、止痒之效,因而嘱其每日用1:4000的高锰酸钾溶液清洗后涂擦痱子粉两次。同时配合中药:山栀、酒制黄芩各12g,龙胆草、泽泻、苍术、黄柏、柴胡各9g,苡仁15g,土茯苓24g,生甘草6g,水煎,每日1剂,分3次服。1周后竟获痊愈。

十多年来,笔者又以此法治疗9例,男性8例,女性1例;年龄21~56岁,其中41~50岁7例,21岁1例,56岁1例。病程:5~15日者4例,16~28日者5例。均于治疗1~2周左右痊愈。经随访6~8个月均未见复发,思此法简易可行,故报道于此。

注意点:痱子粉外搽法忌用于表面糜烂、渗液较多的患者,因其易与渗液凝结成痂,引起继发感染。