

参 考 文 献

1. 全国糖尿病研究协作组调查研究组. 全国14省市30万人口中糖尿病调查报告. 中华内科杂志 1981; 20:678.
2. Zhong Xue-Li, et al. Early treatment of diabetic neuropathy. Chinese Medical Journal 1981; 94(8):503.
3. Porte DJR. Diabetic neuropathy and plasma glucose control. Am J Med 1981; 70:195.
4. Ronald J. Glycemic control and nerve conduction abnormalities in non-insulin dependent diabetic subjects. Ann Intern Med 1981; 94(3):306.
5. 高井孝二, 他. 糖尿病神经障碍における下肢末梢 A—V shunt. 糖尿病 1983; 26:399.
6. 沈稚舟, 等. 40例糖尿病患者足背静脉血气分析. 中华内科杂志 1984; 23:475.
7. 郑白蒂, 等. 糖尿病神经病变治疗的探讨. 中华内科杂志 1981; 20(9):523.
8. 北川勳, 他. 懷慶地黄茎の成份. 薬学雑誌(日) 1971; 91:593.
9. 秦万章, 等. 血瘀和活血化瘀的研究进展及其前景(续). 中医杂志 1980; 10:795.

逍遥丸治疗男子乳房发育症35例

安庆市第一人民医院 谢昭安 刘佩欣

安庆市第二人民医院 胡成侠

我们从1974~1984年,用逍遥丸治疗男子乳房发育症35例,现报告如下。

临床资料 本组35例,年龄最大73岁,最小17岁,平均年龄33.3岁;青壮年20例约占57%,50岁以上者15例约占43%。病程:最长为5年2个月,最短3个月。合并症:左侧隐睾3例,右侧隐睾1例,左、右侧睾丸肿瘤各1例,左侧睾丸外伤切除术后1例,计有睾丸疾患者7例;血吸虫性肝硬化7例;有肝炎病史肝肿大者2例;无合并症者19例。症状和体征:一侧乳房肥大32例,两侧乳房肥大3例;一侧乳房肥大伴有胀痛者9例,一侧乳房肥大伴有少许乳性分泌物者2例;35例中检查时均有轻度压痛。乳房肥大最大者直径7.5cm与成年妇女乳房相当;最小直径3.5cm。治疗前做活体组织检查的15例,均报告为男子乳房发育症。

治疗方法 逍遥丸(安徽省安庆市第一制药厂生产),每次9g(约100~110粒左右),每日3次,饭后温开水送服,3个月为一疗程。

结 果

1. 疗效评定标准:(1)治愈:乳房肥大完全消失,疼痛消失,无压痛,停止乳汁分泌。(2)有效(或好转):治疗3个月乳房肿块缩小原来的1/2或1/3。疼痛和压痛均减轻或消失,乳房未完全恢复正常。(3)无效:治疗3个月乳房肿块大小、质地无变化,仍有疼痛和压痛。

2. 按发病时间长短观察治疗结果:(1)发病3个月以上、1年以内者25例(占71.4%),其中15例服药45天后乳房肥大完全消失;10例服药95天肥大消

失,乳房恢复正常。(2)发病1年以上、3年以内者7例,服药110天后,其中5例肥大完全消失;2例较原来缩小了2/3。(3)发病3年以上的3例,其中1例服药90天肥大完全消失;1例服药90天后乳房略有缩小,因做睾丸肿瘤切除手术,故未坚持服药治疗;另1例合并睾丸外伤术后的患者在服药45天后,乳房肥大明显缩小,但由于不合作而中断治疗。本疗法总治愈率为89%(31/35)。术后随访了24例,其中1例合并晚期血吸虫病肝硬化患者乳房肥大复发,直径为4cm,余23例乳房发育正常。随访时间最长3年半,最短为8个月。

体 会 一般认为,男子乳房发育症既不会引起瘤变,也不会影响健康和劳动,因此毋需特殊治疗,往往在数月后常能“自愈”。但我们在临床上遇到的35例患者病程较长,部分病程长达3~5年之久而不愈,既影响美观,同时又加重了患者的思想负担,往往求治心切。在治疗上,考虑使用男性激素的效果不肯定,且有副作用。根据中医“万病不离乎郁,诸郁皆属于肝”之说。乳房乃肝之野,脾胃之属。因此我们采用了舒肝、理气、解郁的治疗原则,选用了逍遥丸。逍遥丸中药用柴胡、薄荷、生姜以顺其肝性,使之升发条达,且引药直达病所;当归、白芍荣血柔肝,以养肝之体;白术、茯苓、甘草健脾和中,以培生化之源。诸药共奏疏肝理气、健脾补血之功,使肝气舒、郁自解,脾胃健、湿痰除,故其证可愈也。

从上述观察似可表现发病时间短者,使用本疗法疗效较佳。另外,我们还体会到中成药使用方便,疗效满意,未发现副作用。