

6. 高海泉, 等. 中药对血小板生理功能的影响. 中西医结合杂志 1984; 4(4):246.
7. 周远鹏. 葛根的药理作用和临床应用研究进展. 中西医结合杂志 1984; 4(11):699.
8. 尹宝光, 等. 水蛭对实验性脑血肿及皮下血肿的影响. 中西医结合杂志 1986; 6(7):407.
9. 徐理纳, 等. 22种活血化瘀药对狗外周血流量的研究. 新医学杂志 1976; 5:40.
10. 过鑫昌, 等. 蒲黄对血脂、血小板功能影响的研究. 上海中医药杂志 1985; 10:45.
11. 高应斗, 等. 血竭对血液流变性及血小板聚集功能的影响. 山西医药杂志 1983; 12(4):193.
12. 张陈福, 等. 益母草的活血化瘀实验性研究进展. 中西医结合杂志 1984; 4(10):638.
13. 张陈福, 等. 益母草抗血小板聚集的机理研究. 中西医结合杂志 1986; 6(1):40.
14. 王继峰, 等. 赤芍成分及其衍生物抗血小板聚集和调节氧化作用的研究. 中西医结合杂志 1984; 4(12):746.
15. 郭占忠, 等. 二十四种中药对血液粘度直接影响的观察. 中医药学报 1984; 5:51.
16. 翁维良, 等. 20种活血化瘀药对血液粘滞性作用的比较观察. 中医杂志 1984; 25(2):69.
17. 廖福龙, 等. 活血化瘀药物药性的血液流变学研究. 中西医结合杂志 1986; 6(2):104.
18. 翁维良, 等. 王清任常用活血化瘀药对红细胞变形性影响的观察. 山西医药杂志 1987; 16(1):26.
19. 吕恩武, 等. 九种中药的抗血栓形成作用. 中西医结合杂志 1981; 1(2):101.
20. 李连达, 等. 20种活血化瘀中药对麻醉犬心脏血液动力学的影响. 上海中医药杂志 1982; 2:47.
21. 俞之杰. 21种中药对体外纤维蛋白的溶解作用的观察. 中西医结合杂志 1980; 6(8):484.
22. 王中枢, 等. 丹参酮ⅡA磺酸钠的促纤溶作用. 中西医结合杂志 1986; 6(10):608.
23. 吕恩武, 等. 赤芍精对喂高胆固醇高脂肪大鼠血液状态的影响. 中西医结合杂志 1983; 3(3):109.
24. 邵启惠, 等. 以活血化瘀法为主治疗糖尿病的初步观察. 上海中医药杂志 1983; 5:16.
25. 梁亚云, 等. 复方中药注射液抗肿瘤作用的初步实验研究. 中西医结合杂志 1986; 6(9):550.
26. 李新吾, 等. 归红液对兔内毒素血症血清溶酶水平的观察. 中西医结合杂志 1985; 5(9):559.
27. 刘平, 等. 当归芍药散治疗功能性子宫出血83例报告. 中医杂志 1983; 24(6):29.
28. 何愉生, 等. 活血Ⅱ号注射液对老年冠心病患者血浆 β -血小板球蛋白的影响. 中西医结合杂志 1984; 4(10):588.
29. 王龙, 等. 解心痛的药理作用研究. 中成药研究 1984; 7:28.
30. 王筠默, 等. 复方丹参片的药理作用研究. 中成药研究 1984; 11:24.
31. 崔乃强, 等. 复方红花注射液对术后血液流变学某些指标的影响. 中西医结合杂志 1984; 4(7):407.
32. 王行法, 等. 补阳还五汤治疗脑血栓形成的临床及血液流变学观察. 中医杂志 1984; 25(6):35.
33. 吴肇聪, 等. 补阳还五汤的临床应用. 广西中医药杂志 1984; 13(1):50.
34. 孔昭遐, 等. 活血化瘀法治疗紫癜、红斑类皮肤病. 中医杂志 1982; 23(12):32.
35. 颜乾麟. 血府逐瘀汤的临床研究. 浙江中医杂志 1981; 16(10):428.

颈椎定点旋转复位法治疗颈椎病性耳鸣18例

空军总医院 邱志衍 王玉珩 严国芳*

我们自1986年4月~1987年6月, 用手法复位治疗颈椎病性耳鸣18例, 报告如下。

一般资料 本组18例中, 男3例, 女15例。年龄17~59岁; 病程2个月~12年。耳鸣, 单侧12例, 双侧6例; 鼓膜中度内陷1例; 电测听检查12例, 均存在着不同程度的听力曲线下降; 脑血流图检查13例, 椎一基底动脉供血不足者5例, 血管紧张度增高1例; 伴有颈椎症状者4例; 颈项肌痉挛12例; 关节囊肿胀17例; 颈椎棘突偏歪伴有压痛9例; X线均有颈曲度及椎体异常。

治疗方法 本组病例均单纯采用冯氏颈椎定点旋转复位法(冯天有, 中西医结合治疗软组织损伤, 第1

版, 北京: 人民卫生出版社, 1977:36), 患者端坐位, 颈部放松, 头略前屈, 尽量向活动受限侧旋转。医生在背后, 一手拇指顶推偏歪高隆棘突患侧面, 余4指扶持颈部。另手掌心对准下颌, 五指握拳并向直上牵提和向受限侧旋转头颅。另手拇指向颈前方轻微顶推棘突高隆处, 闻响声便可复位, 术毕。此法每周1次。

疗效标准与结果 经1~7次手法治疗, 耳鸣消失, 颈椎棘突无偏歪, 颈项肌痉挛及关节囊肿胀消失为痊愈。上述症状有改善者为有效, 症状无改善者为无效。治疗结果: 痊愈8例, 有效7例, 无效3例。对6例痊愈者随访3~11个月, 除1例劳累后偶有耳鸣外, 余无复发。

* 空军科研所门诊部