

毛囊炎168例，急性乳腺炎35例，外痔12例，疔26例，蛇咬伤3例，虫咬伤92例，牙髓炎23例，外伤感染5例。病程1~7天465例，8~15天135例。

治疗方法 活蜈蚣两条，浸入75%酒精500ml内，再加红花5g，浸泡7天后即可使用。用棉杆蘸药液涂搽患处，每日搽3~5次，3~10天为1疗程。

结果 疗效标准：痊愈：炎症完全消退，无复发。显效：当时治好，过数月又复发，不能除根（如牙髓炎）。好转：当时减轻疼痛，容易复发（如外痔）。无效：治疗前后无改善。痊愈560例，显效23例，好转12例，无效5例（均属外伤引起）。

典型病例 马某，男，45岁，门诊号1375。1981年4月患者左手中指红肿灼痛两昼夜，疼痛难忍，不能入眠。西医诊断为左中指炎，遵医嘱肌注青霉素，患者拒绝，前来我科诊治，经用蜈蚣酒涂搽患处，即有凉感，疼痛减轻，患者带回药液5ml，每日搽5次，3天后痊愈，随访未见复发。

体会 蜈蚣含类似蜂毒的两种有毒成分，即组织胺样物质和溶血蛋白质，此外尚含酪氨酸、亮氨酸、蚁酸等。蜈蚣味微辛，性微温，走窜之力最速，内而脏腑，外而经络，凡气血凝聚都可解开，有转善解毒的作用。搽药后感到发凉痛减，红肿消失，或者红肿更大，而无痛感。此液适用于炎症早、中期及溃烂期，但溃烂排脓时，只能在局部周围涂搽。对外伤感染无效。

外用擦调散治疗湿疹 200例

解放军56031部队卫生队

陈友宏

近年来我们结合老山战区生活环境易致皮肤发病的特点，自拟外用擦调散治疗急、慢性湿疹200例，效果较好，总结如下。

一般资料 200例湿疹患者中，急性172例，慢性28例，多系男性，年龄16~68岁。发病部位：头部、耳部、外阴及肛门。病程7天~2年，其中7天~3个月118例；3~6个月54例；6个月~2年28例。200例在就诊前都经西药治疗，效果不佳或反复发作。

治疗方法 药物配制：（1）搽剂：苦参、黑豆各

300g，白藓皮、大枫子各250g，木槿皮、地肤子、苍术各150g，生葱20根，五倍子100g。共加水煎两次，合并药液800ml，再用95%酒精200ml溶解樟脑、冰片各20g后缓缓加入药液中过滤分装。（2）散剂：硼酸、氧化锌各500g，氯化铵150g，滑石粉1000g，混合备用。用法：先用50%氯化钠溶液清洗患处皮肤，再将中药搽剂外擦患处。用搽剂后，患处流水甚者，将散剂撒布揉搓，流水不甚者，用凡士林调擦患处。1日3次，7天为1疗程，最多不超过3个疗程。

结果 疗效标准：治愈：症状体征完全消失，并在1年内无复发者；好转：症状体征完全消失，6个月再发者；无效：症状体征无改善或略有加重者。结果：200例经治疗1~3个疗程，治愈172例，好转23例，无效5例，有效率达97.5%。

典型病例 文某，男，21岁。反复阴囊湿疹1.5年。入战区后阴囊皮肤瘙痒加重，晚间尤甚，影响睡眠。查：阴囊皮肤粗糙不平，皮肤增厚，状如鱼鳞，位于会阴部皮肤呈红色，抓破有渗出液，小部分皮肤有糜烂，诊为阴囊湿疹。经用上药2日，瘙痒减轻，皮肤色变灰暗，2周后告愈，至今未复发。

体会 本方对急慢性湿疹有明显止痒、消肿、消炎、镇痛、抑制分泌物的作用，且疗程短，疗效巩固，无副作用。但用药期间，应保持局部卫生，防止搔抓，忌辛、辣、烟、酒等刺激性食物。此药只能外用，禁止内服。

介绍髋关节手法简易复位法

安徽省蚌埠市第二医院骨科

李幼德 李德霖

我院近10年来对髋关节复位采用中医简易复位24例，复位率达100%。患者痛苦小，均为1人操作复位成功。24例中无1例发生并发症，现介绍如下。

操作方法：患者平卧于地，术者双手交叉紧托患肢腘窝部，术者臀部坐在患肢脚背上，两腿夹紧患肢，用双手将患肢腘窝部用力向上提，同时术者将全身重量对准患肢足背用力向下坐。上提下坐必须同时进行，髋关节即可立即复位。此复位方法简便，只需术者1人操作，痛苦小且无需麻醉，绝大多数只需一次操作复位即可成功。