

变,在12例无效患者中仅有4例有改变。患者治疗前血浆比粘度、血小板粘附率的平均值与正常组比较,差异均有显著性意义($P < 0.01$),治疗后上述指标均与正常组接近($P > 0.05$),说明治疗前患者确有血瘀现象存在,治疗后增加了血液的流动性,使血瘀现象得到改善。

145例癌症患者活血化瘀汤治疗前后体外血栓形成变化 范忠泽,等(上海普陀区中心医院) 145例患者中男66例,女79例;年龄30~80岁,平均54.43岁。其中胃癌34例,肺癌29例,乳腺癌29例,食道癌、肝癌各5例,胰腺癌、甲状腺癌各3例,其他癌症27例。观察用活血化瘀汤(丹参12g 桃仁9g 王不留行9g 地鳖虫9g,水煎分2次服,连服1个月)前后患者体外血栓形成变化。结果:145例患者用药前、后血栓长度(mm)、湿重(mg)、干重(mg)分别为 35.89 ± 2.24 、 25.04 ± 1.87 、 110.93 ± 8.44 、 73.10 ± 6.26 、 49.23 ± 5.25 、 27.74 ± 3.16 ,治疗后较治疗前血栓长度缩短,重量降低(P 均 < 0.001)。同时观察到带瘤者血栓并发率达62.34%,病情恶化者较病情稳定者血栓明显延长,重量增加,提示血栓变化与病情呈正相关关系。

消瘿丸治疗甲状腺腺瘤及药理实验 伍锐敏,等(中日友好医院) 甲状腺腺瘤患者78例,其中女66例,男12例。治疗仅采用消瘿丸:风化硝 姜半夏 莪术 连翘 制乳香 制没药等,共为细末,制成小丸药,早、中、晚饭后各服6~9g,3个月为1个疗程。结果:服药最短者1个疗程,最长者4个疗程。治愈12例,显效25例,有效27例,无效14例,总有效率82%。药理实验将消瘿丸按处方比例制成100%水煎剂,观察急性毒性作用及棉球肉芽肿增生和血管通透性的影响。结果表明小鼠最大耐受量50g/kg,无任何反应。对棉球肉芽肿增殖有明显抑制作用,对血管通透性也有抑制作用。表明消瘿丸可能通过调节甲状腺局部结缔组织代谢,阻止其增殖达到治疗作用。

活血方治疗70例银屑病临床观察及其机理研究 羊一君(上海市徐汇区天平路医院) 70例均为寻常型银屑病患者,其中进展期52例,静止期18例;病程1个月~10年。治疗采用活血方:当归、红花、川芎各12g,丹参、鸡血藤、三棱、莪术各9g,生牡蛎、珍珠母各30g,随证加減,每日1剂水煎服,4周为1个疗程,观察3个月至1年。结果:基本痊愈19例,显效21例,有效20例,无效10例,总有效率85.7%。治疗前实验室检查:(1)皮肤毛细血管

镜检查见甲皱襞处视野模糊,毛细血管形态弯曲不规则;(2)血液流变性检测,显示全血粘度及血浆粘度均升高,红细胞电泳时间延长;(3)环核苷酸测定显示cAMP含量下降,cGMP含量升高,两者比值变小;(4)N-乙酰神经氨酸测定,发现其含量水平明显升高;(5)IgG、IgA、IgM测定其值均升高。经治疗,随着临床表现改善,上述指标亦有明显改善。以上说明活血方的治疗效果可能是通过改善微循环,扫除病理处障碍或抑制过度的细胞增殖而取得的。

活血化瘀法治疗毒蛇咬伤29例临床观察 陈远辉(湖南省郴州地区莽山林业管理局职工医院) 29例患者中男16例,女13例;年龄9~57岁。分为活血化瘀加蛇药组16例,用蛇伤祛瘀解毒汤(大黄、白芷、五灵脂、赤芍、当归、红花、青木香、柴胡、花粉、丹参、蒲公英、甘草)加減,每日1剂,重者2剂水煎分2~3次服。另用1剂加食盐50g,煎开后熏洗患部(须在受伤12~24小时后才可用),每次约1小时。郴州蛇药片,每次10片,每日3次。活血化瘀组13例,除用蛇伤祛瘀解毒汤外加用654-2注射液肌注,潘生丁、阿斯匹林、双氢克尿塞、地塞米松、扑尔敏等药口服。结果两组均全部治愈,治愈时间活血化瘀加蛇药组1~8天,平均5.1天;活血化瘀组1~29天,平均5.8天。

活血化瘀为主治疗子宫内膜异位症40例疗效观察 林育祺,等(中国中医研究院西苑医院妇科) 40例子宫内膜异位症患者中通过临床确诊者29例,病理诊断11例。属内在型2例,外在型35例,混合型3例。年龄23~46岁。病程1~10年26例,10年以上14例。未婚1例,已婚39例。按Acosta分度法,有轻度病变的异位症20例,中度病变1例,重度病变19例。

治疗分以下4型:(1)寒凝血瘀型(25例):除表现血瘀的一些症状外,还兼有寒证。治以温经散寒,活血化瘀。方用少腹逐瘀汤:小茴香、干姜、川芎、生蒲黄、肉桂各6g,元胡索、赤芍、五灵脂各10g,当归15g,制没药3g。(2)气滞血瘀型(10例):除有血瘀症状外,还有肝郁气滞的典型症状。治以疏肝理气,活血化瘀。方用血府逐瘀汤加金铃子散:当归、桃仁各15g,生地、赤芍、柴胡、牛膝、川楝子、元胡索、炙甘草各10g,川芎、红花、桔梗、枳壳各6g。(3)气虚血瘀型(3例):患者素体脾气虚弱,或原来气滞血瘀之实证,病久则转为气虚血瘀之虚证。治以益气升阳,活血化瘀。方用少腹逐瘀汤加炙黄芪20g,党参10g,升麻、木香各6g,去五灵脂。(4)热郁血