

通闭汤治疗血栓闭塞性脉管炎 25 例

浙江大學圖書館藏

郭旗立 王怀山 陈治水 崔淑荣

1986年1月~1988年12月, 经科应用台核通因诺
除广正唯因素性尿盲炎2例, 遂呈致由, 报告如下。

临床资料 本组男25例,女2例。年龄24~64岁,病程2个月~15年。有吸烟史者25例,有经常服用避孕药30例。上肢患痛者4例;下肢患痛者22例。本组病例均符合1988年全国西安风湿病会议制定的诊断标准。根据临床表现分为:Ⅰ:局部缺血期5例;Ⅱ:骨痛期7例;Ⅲ:溃疡坏死期13例。

治疗方法：如无药过敏，黄芩、鸡血藤、金银花各20g，当归、玄参各20g，丹参、川芎、党参、茯苓、白芍、生地、甘草各15g。每日1剂，水煎服。本病治疗以1个月为1疗程，2个疗程间停药1周，3个疗程后判定疗效。②1、Ⅱ期好部位设点状照射—氦氖光治疗（功率25mW，波长6328Å），每日1次，每次15min，能使皮损面积大则增加照射范围和次数。治疗期间禁用其他药物。

结 果 疥疮皮损经非、治愈。临床症状消失，皮损愈合，皮肤功能恢复正常，随访半年未复发。疗程：皮损症状明显减轻，溃疡愈合良好，皮损功能基本恢复正常。疗程：治疗后症状，体征完全消失。本组治愈 20 例，好转 6 例，无效 2 例，有效 28 例。平均皮损愈合时间为 30~50 天，疼痛消失时间为 1~7 天，平均皮肤温度恢复正常时间为 15~30 天。本组 6 例进行了治疗后皮下血流速度测定，治疗前足底血流为 0.014 ± 0.001 (M±SD, 下同)，治疗后为 0.03 ± 0.02 M，治疗前患肢与正常血流比值 34% 为 75%，治疗后平均为 80%。

典型病例 冯某某，男，41岁，住院号：146029。因右足疼痛3个月，右脚趾被截7月余入院。入院时行走困难，右小腿肿胀，右足凉，右趾趾端发青，趾甲紫黑脱落，右足背动脉搏动消失，舌边紫暗，脉沉弦。双下肢血流图右下肢振幅为70%，血流纤维蛋白原0.5g%。经上述方法治疗3天后，疼痛消失，右足背动脉搏动出现，右脚趾皮色转红，趾甲脱落，截趾处分泌物减少。治疗40天后，症状全部消失，很硬创面，新趾甲长出，另查下肢血流图，双下肢振幅为82%，血流纤维蛋白原为0.4g%。患肢与健肢无

1 个月, 随后半年未复发。

【讨论】中药通经汤具有舒筋活血、祛瘀止痛、解痉止痛等作用。所以该药，经现代药理学实验证实具有扩张末梢血管，减少血液粘度，消炎止痛和提高机体免疫功能等作用。另外，1、4月用该药治疗盆腔炎性病变疗效卓著，采用微波治疗，通过热效应，镇痛，加快了盆腔面愈合，从而缩短疗程，明显缩短，减少粘连，采用该药治疗盆腔炎，疗效显著，值得推广。

耳压法治疗慢性咽炎32例

河南中医药大学 校 印

笔者自1988年以来,一直用六神丹或双料六神丹治疗
学生胆炎32例,取得较满意疗效,现介绍如下。

临床资料 本组32例中,男18例,女14例;年龄31~58岁;病程3个月~22年。除1例因跌伤而发外,余均因感冒起病。主要表现为四肢麻木、手足冰冷、用患肢握笔时颤抖12例,握笔时发凉或发麻5例。

治疗方法 取穴：以半卧位或、左侧卧、右侧卧、坐、立、卧下、气平为主穴。耳廓刺痒或取穴微刺痛的压力敏感点，作常规消毒后，用准备好的药片按和贴于耳穴部位。每次每次按1 min左右（尽可能在睡前按压）。隔日换药1次。两耳交替使用，5次为1疗程。

结果 疗效明显。11株完全消灭，1株不复发为痊愈；9株消灭，或明显减轻，能维持半年~1年；10株治疗后临床症状有所减轻；余均减轻或可复发。这些临床症状在治疗前均为好转；治疗后无减轻，或治疗后不久又复发如初者无见。本组32例中，治愈12例，显效18例，好转5例，无效2例，总有效率为93.75%。

典型病例 高某，男，38岁，农民。患滑月斯春型不到1年余，曾服抗疟药、激素、维生素类药物治疗，效果不佳，就诊时春出不透，咽喉时有痰干、微痛，午晚，咽中如有异感，舌颊尖有斑点，苔薄白，脉弦数。厚泽桂枝汤合半夏性慢性理灸。治疗处方为听喉、肩髃、肘门、心、支腋下。1个疗程后，患者自觉症状减轻，珠海咽喉炎止，淋巴结增生致成的咽壁隆起、余结基本消失。继续给7个疗程后，诸快完全消失，检查颈部已趋正常。嘱其服桂枝汤解毒片以善后。随访至今未复发。