

活血化癥方药能促进眼底、玻璃体出血的吸收。通过增加屈光介质的透光度，快速清除血块有害的分解产物，使ERG明显恢复。

活血化癥改善ERG可能为以上作用的综合效应。此外活血化癥药物还可能影响R—膜，改变视网膜电阻，增强正常视网膜细胞代谢，发挥正常视网膜的代偿功能。但尚缺少这方面的证据，有待于利用视网膜、甚至细胞内微电极技术予以证实。

参 考 文 献

1. 徐俊义,等. 活血化癥治疗视网膜静脉阻塞的疗效观察. 中西医结合杂志 1983; 3(3):140.
2. 北医三院眼科教研室. 中医治疗视网膜静脉阻塞的疗效观察. 新医药学杂志 1975; (11):29.
3. 姚芳蔚. 虎杖、丹参离子透入治疗眼内出血小结. 中西医结合眼科 1983; (3):48.
4. 张惠蓉. 视网膜中央静脉阻塞患者血小板电镜观察及服中药后的变化. 中华医学杂志 1980; 60(5):293.
5. 徐俊义,等. 活血化癥治疗视网膜静脉阻塞的疗效机理

- 研究——外周微循环观察. 中西医结合杂志 1985; 5(2):97.
6. 周国筠,等. 虎杖、熊胆注射液治疗玻璃体出血的实验研究. 眼科通讯 1987; (4):24.
 7. Jagadeesh JM. Influence of chlorpromazine on the rabbit electroretinogram. Invest Ophthalmol Vis Sci 1980; 19(12):1449.
 8. Banyard RD, et al. Retinal effects of ruby laser photocoagulation—Microelectrode recordings in the rabbit. Arch Ophthalmol 1971; 85:107.
 9. Ogden TE, et al. Correlation of histologic and electroretinographic changes in peripheral retinal ablation in the rhesus monkey. Am J Ophthalmol 1976; 81(3):272.
 10. Mandelbaum S et al. bright-flash electroretinography and vitreous hemorrhage. An experimental study in primates. Arch Ophthalmol 1980; 98:1823.
 11. 金惠铭. 丹参制剂的临床运用及其活血化癥原理的研究. 中华医学杂志 1978; 58(3):180.
 12. Regnault FR. Vitreous hemorrhage: an experimental study. Arch Ophthalmol 1970; 83:458.

消瘰丸加味及外敷青黛散治疗流行性腮腺炎 406 例

甘肃天水航修厂医院 贾隆兴 郭华荣

我们于1986年10月~1987年3月，应用消瘰丸加味及外敷青黛散治疗流行性腮腺炎406例，疗效比较满意，报告如下。

临床资料 406例中，男264例，女142例。年龄6个月~21岁，其中1~5岁208例，6~10岁130例，11~15岁56例，16岁以上6例，1岁以下6例。患者大多数于发病3天来诊，其中发病1天来诊者168例，2天来诊者204例，3天来诊者34例。全部病例均符合实用儿科学标准：(1)当地的流行病史及发病前与腮腺炎患者的接触史；(2)特殊的临床症状包括耳下部非化脓性肿大，双侧耳下部肿大，咀嚼时疼痛，颊内腮腺管口红肿。

治疗方法 消瘰丸加味组成：元参15g 牡蛎15g (先煎) 贝母10g 蒲公英10g 金银花15g 连翘15g 花粉10g 虎杖10g 夏枯草10g，每日1剂，水煎2次温服，根据年龄剂量酌减。咽喉肿痛者加牛蒡子、桔梗；发热重者加薄荷、黄芩、板蓝根、龙胆草；肿甚者加生石膏、芦根；呕吐甚者加代赭石、竹茹；便秘者加大黄、玄明粉；结肿不散者加海藻、昆布；并发睾丸炎者，可酌加川楝子、桔核、龙胆草；嗜睡抽搐者加服紫雪丹、至宝丹。同时外用自制青黛散（青

黛1g 冰片1g 芒硝5g），用少许凡士林拌匀，涂于局部，外敷纱布，每日1次。

结 果 疗效标准：痊愈：1~2天内体温恢复正常，局部肿块消失；显效：症状明显好转，局部肿块较治疗前缩小50%以上，3天内痊愈；有效：症状好转，复诊时局部肿块缩小50%以下，在4天内痊愈；无效：经治疗5天以上未愈者。406例患者经治疗后，单侧发病290例，痊愈186例，显效96例，有效8例；双侧发病116例，痊愈68例，显效36例，有效12例。在1~2天内痊愈者254例，占62.6%；2~3天内显效者132例，占32.5%；4天内有效者20例，占4.9%。总有效率100%。

体 会 消瘰丸是《医心方》一书中治疗瘰癧代表方剂，具有清热化痰，软坚散结，泻火解毒之功。腮腺炎是风热时毒或湿热蕴结郁阻少阳、阳明之经，治宜疏风清热，解毒消壅，散结消肿为主。方中元参清热消肿，贝母化痰散结，牡蛎软坚散结。三者相伍，共具清热化痰消肿软坚散结，泻火解毒之功，配以清热解毒之品，其效更著。外用青黛散增强了清热消肿止痛、防腐、解毒之效。