

例(88.2%), 好转2例(5.9%), 无效2例(5.9%), 总有效率为94.1%。服药后, 一般第2~4天, 症状完全消失。4例有上感者, 给予对症处理。

讨 论 算盘子 [*Glochidion puberum* (L.) Hutch] 属于大戟科植物。有清热利湿, 解毒消肿, 收敛止泻的作用。民间常用于治疗胃肠积滞所引起的腹痛、腹泻、痢疾等症。药理实验表明, 算盘子全草含有酚类、氨基酸、糖类, 茎叶含有鞣质。其水煎剂在体外, 有抑制志贺氏杆菌的作用, 对痢疾杆菌和沙门氏杆菌有一定的抗菌作用。低浓度抑菌, 高浓度杀菌。

我们初步观察算盘子对急性胃肠炎的疗效是肯定的。抗菌消炎, 收敛止泻, 止痛, 尤以止泻止痛效果显著, 且使用安全无副作用。首次加倍用量。有利于提高药物抑菌、杀菌的作用。算盘子水煎剂没有补充体液的作用。在治疗过程中, 酌情对酸中毒, 较严重失水患者补充液体, 以调节体内酸碱平衡, 促进病情恢复。

行气整肠汤治疗胃下垂 200 例 疗效观察

辽宁省锦县中医院

张茵州 陈守信 郭玉茹 张 犁

辽宁省锦县人民医院

侯德森 张国芹 张 瑞 方桂成

近8年来, 我们运用自拟行气整肠汤内服治疗胃下垂200例, 疗效满意, 报告如下。

临床资料 本组252例, 均经X线钡餐造影, 将胃下垂分为三度: 轻度: 小弯切迹降至两髂嵴嵴联线水平以下1~5cm者; 中度: 降至6~10cm者; 重度: 下降10cm以上者。另外全部病例均有不同程度的消化不良、便秘、暖气、恶心、腹胀痛, 特点是立位重, 卧位轻。252例分为两组。治疗组200例, 男132例, 女68例。18岁以下3例, 19~35岁67例, 36~55岁130例。病程6个月~1年26例, 1~5年92例, 6~10年70例, 11~24年12例。胃下垂轻度102例, 中度86例, 重度12例。对照组52例, 男42例, 女10例。19~35岁18例, 36~55岁34例。病程6个月~1年7例, 1~5年24例, 6~10年18例, 11~24年3例。胃下垂轻度26例, 中度23例, 重度3例。

治疗方法 治疗组用行气整肠汤: 木香30g 厚朴30g 大腹皮30g 槟榔片30g 莱菔子30g 枳壳30g, 每日1剂, 加水2000ml, 文火煎浓缩至250~300ml

左右, 早、晚两次分服。24天为1个疗程, 1个疗程结束后停药两天, 再进行第2个疗程。对照组口服中益气汤原方, 早、晚各服1次。治疗期间不用其任何药品。

结 果 疗效判定: (1) 痊愈: 症状消失, X线钡餐造影胃小弯切迹平于或在两髂嵴嵴联线水平以上 (2) 好转: 中度转变为轻度, 或重度转变为中度; (3) 无效: 症状及X线钡餐造影无变化。结果: 两组均2个疗程的治疗, 治疗组痊愈145例, 好转52例, 无效3例, 有效率为98.5%。对照组痊愈12例, 好转19例, 无效19例, 有效率63.5%。两组有效比较差异显著性意义($P < 0.005$), 说明行气整肠汤对胃下垂较好疗效, 半年后随访无复发。

讨 论 从中医学角度看胃下垂属中医胃缓证多责之于脾胃失和, 中气不足运化无力, 气机阻滞脉弛缓不收。临床实践证实行气整肠汤具有和胃健之功, 使胃肠道蠕动增强, 疏通脾胃气机, 协调气升降, 故使脾胃和, 气机通, 升降如常, 使筋脉弛之症愈。故其疗效、治愈率高于补中益气汤对照组

一贯煎合消风散加减治疗 皮肤病124例

江西万载县中医院 刘远坝

笔者自1983年3月~1988年3月采用一贯煎合消风散加减治疗皮肤病124例, 取得较好的疗效, 现报如下。

临床资料 124例中男81例, 女43例; 年龄3~13岁30例, 14~49岁37例, 50~87岁57例; 病程5~23年; 其中皮肤瘙痒症64例, 慢性湿疹30例, 荨麻疹18例, 玫瑰糠疹12例。就诊前大多接受过抗组织胺、皮质类固醇、钙剂、维生素类等西药治疗。

治疗方法 一贯煎合消风散为基本方, 荆芥、防风、苦参、麦冬、当归、枸杞子各10g, 生地、知母、沙参各15g, 蝉衣、川楝子、木通、甘草各8g, 每日1剂, 水煎分两次服, 10天为1个疗程。大便秘结火麻仁15g、杏仁10g, 夜寐不安加合欢皮15g、五子10g, 肝旺者加生牡蛎15g(先煎)、刺蒺藜10g, 湿热者加土茯苓15g、虎杖10g。以上为成人用量, ~5岁各减5g, 6~13岁各减3g。

结 果 疗效标准: 皮肤瘙痒等自觉症状消失皮疹完全消退为治愈; 皮疹大部分消退, 皮肤瘙痒白症状有不同程度的改善为有效; 未达到有效标准为无效。