

发病最短3天,最长10天。病灶均发生在身体一侧,全部患者均在门诊治疗。绝大部分患者均接受其他各种治疗后疗效不显著而来我院就诊。根据有成簇性皮疹,沿神经排列成带状,单侧性及明显神经痛,疱疹由小米到绿豆大丘疱疹,疱壁紧张发亮,疱液澄清,皮损分布通常在身体一侧,以躯干中线为界,皮肤敏感异常等特点而确诊。

治疗方法 雄黄油方:柿油100ml,沸雄黄5~8g,调匀后备用或现调即用,用时以鹅毛或软的小刷子,将雄黄油涂搽在疱疹局部,第1天5~10次,次日涂搽次数可减少,用此药时可停止使用任何药物。一般用药4~7天。

结果 痊愈标准:疼痛停止,疱疹消退,皮损脱落,皮损消失而恢复正常。结果,涂搽雄黄油30分钟病灶区烧灼痛停止,1~3天疱疹消退,5~7天皮损脱落,皮损消失而恢复正常,不留瘢痕,216例均治愈。治愈所需时间平均为5.9天,未见任何副作用及不良反应。

典型病例 朱某,女,37岁,干部。于1985年5月23日因腰腹部烧灼痛3天来院就诊。曾在某院注射板蓝根、维生素B₁₂,内服病毒灵等药物无明显疗效而来我院就诊。

体检:体温38.1℃,脉搏80次/分,血压120/78 mmHg。右腰至腹部,于第2腰椎平行,有4处皮肤红,有较密的小疱疹,高出皮肤,透明,暗红色和暗紫色,有间隔,形如带状。实验室检查:血白细胞10500,中性80%,淋巴20%。诊断:带状疱疹。当即以雄黄油涂搽局部,30分钟后烧灼痛停止,涂药2天疱疹消退,继续涂搽至第6天皮损脱落,皮损消失而痊愈。

体会 带状疱疹属于中医学的“缠腰火丹”或“蛇串疮”。本病多因情志不遂或肝胆火盛,内蕴湿热,外感毒邪而诱发,多在春秋季节发病。临床上中医分为热盛型和湿盛型。症状为剧烈烧灼痛,热盛型尤为显著,夜深人静剧痛尤为突出,是本病的特点。剧痛使患者无法入睡,导致患者倦怠,精神萎靡不振,食纳大减。在治疗上分为整体治疗和局部治疗,本组治疗全以局部用药,在涂搽雄黄油时不用任何内服药。涂药后疼痛停止,患者得以安睡,精神状态改善,食纳增加。此疗法是上饶的民间方,柿油内主要成份是鞣酸,无刺激,对疱疹及炎症的局部有保护及消炎作用;沸雄黄有消肿的功能。用时应注意,疱疹破溃时不宜涂搽本药。

鲜侧柏叶膏外敷治疗烧伤61例

河南大学医院 荣金玉 徐自力

五年来笔者采用鲜侧柏叶外敷治疗烫火伤61例,取得满意疗效,现报告如下。

临床资料 61例烧伤患者中,男42例,女19例;年龄15~70岁;其中Ⅰ度烧伤6例,浅Ⅱ度烧伤52例,深Ⅱ度烧伤3例。足背部烧伤28例,前胸部烧伤15例,背部烧伤3例,四肢烧伤15例。最大面积20×25cm,最小面积10×16cm,61例中均无合并严重感染。

治疗方法 取新鲜侧柏叶300~500g(视烧伤面积大小而定)洗净,放入臼中捣烂如泥,加75%酒精少许调成糊状备用。使用前先用生理盐水或1%新洁尔灭清洗创面,有水疱者用注射器抽取疱内渗出液。如汽油烧伤,可用软皂水清理创面,而后将调好的鲜侧柏叶膏敷于烧伤部位,外盖无菌纱布,胶布固定,每日3次换药。如无感染不需使用其它药物,一般5天左右即可痊愈。

结果 疗效评定标准:用药后创面愈合,极少有色素沉着,不留瘢痕为痊愈。61例烧伤患者除3例因大面积深Ⅱ度烧伤转其它治疗外,58例均治愈。其中3~7天治愈31例,7~10天治愈27例,在治疗过程中未发现明显的副作用及不良反应。

典型病例 患者张某某,男,62岁,农民。于1984年9月10日,汽油烧伤右下肢小腿内侧,烧伤面积20×15cm,局部发红,起小水疱,浅Ⅱ度烧伤。用软皂水清洗烧伤部位,后用0.9%生理盐水和1%新洁尔灭常规消毒局部。取鲜侧柏叶膏(500g)敷于患处,连续敷药5天痊愈。

体会 鲜侧柏叶性味苦、涩、寒,归心、肝、大肠经,具有清热凉血生肌之功能。对多种细菌都有抑制作用,所含的大量鞣质和维生素C具有收敛、止血、保护皮肤粘膜的作用。本法治疗烧伤,方法简单,取材方便,止痛快,疗效佳,经济实惠,患者乐意接受。在治疗过程中,要特别注意创面的清洁,如发生感染会直接影响疗效。另外,如能配合理疗等方法,效果更好。

小儿急性肾炎64例治疗观察

福建省惠安县医院儿科 黄国平

1986年1月~1988年4月,对小儿急性肾炎64例