

日1剂分3次服。对照组用抗血纤溶芳酸0.2g加5%葡萄糖盐水500ml静脉滴注,每日1次;安络血10mg肌肉注射,每日2次;甲氧咪胍0.4g加10%葡萄糖40ml静脉推注,每日4次。选用2项或3项治疗。两组患者酌情给予输血补液对症处理。

结果 疗效标准:以大便隐血试验转阴为止血标准。3日内止血为显效,7日内为有效,7日以上为无效。结果:中药组:显效27例(77.14%),有效7例(20%),无效1例(2.86%),总有效率97.14%。止血天数最短1天,最长10天,平均 3.5 ± 1.59 天。对照组:显效6例(17.14%),有效18例(51.43%),无效11例(37.43%),总有效率68.57%。止血天数最短1天,最长18天,平均 6.5 ± 4.49 天。两组疗效经统计学处理有非常显著差异, $P < 0.01$ 。

讨论 中医认为溃疡病和慢性胃炎伴出血,系由于饮食不节、肝气犯胃、脾胃虚寒、损伤络脉,瘀血下行则便血。方中地榆含有鞣酸,白芨含白芨胶质,旱莲草含旱莲草素、鞣质、生物碱,蒲黄含黄酮甙、固甾醇,侧柏叶滋阴泻火祛瘀,诸药合用能起收敛、止血、止痛等作用。该药方价廉无副作用,使用方便,药源丰富,便于推广。

中西医结合治疗外阴白色病变82例

宁夏医学院附属医院妇产科 赵 丰

自1983年元月~1989年元月笔者采用中西医结合治疗82例外阴白色病变取得良好效果,现报道如下。

一般资料 年龄:22~59岁,其中生育年龄65例,占73.9%。病程:3~6个月56例,6~12个月3年14例,3~8年12例。临床主要症状及体征:外阴奇痒难忍,外阴、会阴及肛周有不同程度的皮肤、粘膜色素减退、变白、纹理粗糙、肥厚或萎缩,常有水肿、皲裂及散在表浅溃疡,阴道口挛缩、狭窄,阴蒂萎缩且与包皮粘连,小阴唇平坦消失。增生型:44例,其中重者21例,轻者23例;硬化苔藓型38例,其中重者10例,轻者28例,其中58例经病理检查证实。

治疗方法 中药:蛇床子、苦参、连翘各30g,当归、银花各20g,冰片6g(后下),每日1剂,水煎后取药液坐浴,每日2次,每次20~30min,坐浴后患处涂擦0.1%求偶素软膏。2周为1疗程。治疗期间,保持外阴清洁,忌用肥皂擦洗,避免抓伤,勿食辛辣食物,衣着勤洗换。

结果 疗效标准:局部搔痒消失,皮肤粘膜由

白色转至正常为治愈,共52例占63%;局部搔痒消失,皮肤粘膜由白色转为深红色为好转,共30例占37%。每次坐浴后即觉患处止痒、舒适,2~7天后明显止痒,止痒有效率达100%。

体会 本病中医认为系脾虚湿盛,郁久化热,湿热蕴结,夹湿下注,以清热化湿为主。方选中药蛇床子燥湿止痒,苦参清热解毒、除湿,当归能走能散,力刚可攻,活血力大,并且有抗维生素E缺乏症功效;连翘清热解毒,散风热,治疮毒,配银花可增强杀菌能力;冰片性香走窜,性凉而能散热化腐、止痒、止痛。现代医学认为本病系女阴皮肤、粘膜营养障碍而致的组织变性及色素改变的疾病,其病因可能与卵巢功能低下或某种未知因素使外阴组织失去对雌激素的反应有关,故选用求偶素软膏外涂患处。

黄芪皂刺粥治疗术后肠粘连

兰州军区总医院普外科 顾树南

我院于1983年8月~1987年12月用黄芪皂刺粥治疗术后肠粘连125例,效果满意,现报告如下。

一般资料 本组125例中,男74例,女51例。年龄4~72岁,平均34岁。均有腹部手术史,其中阑尾切除术54例,子宫切除术28例,肠部分切除术17例,胃大部切除术12例,脾切除术8例,胆囊切除术6例。病程最长21年,最短3个月,平均1年3个月。均时有腹痛、腹胀和腹部包块,且多次治疗效果不佳。

治疗方法 黄芪皂刺粥是由生黄芪、皂刺和糯米组成。用时先将生黄芪、皂刺各30g加水1000ml,文火煎之。留汁去渣。再把淘净之糯米50g放在药汁之中,加水适量,煮成药粥。每日1剂,早晚2次分服,2周为1个疗程。

结果 疗效标准:显效:腹痛、腹胀和腹部包块消失;有效:腹痛减轻,无明显腹胀和腹部包块;无效:症状、体征无变化。结果:显效80例(64%),有效29例(23%),无效16例(13%)。疗程最短2天,最长2个疗程,平均8天。服药后均未见有明显副作用。随访最长者4年,疗效满意。

讨论 食用药粥自古就有记载。糯米有温补脾胃,补中益气之功效。皂刺辛散温通,性锐长于攻坚。有消肿、托毒、排脓之功。黄芪有补气升阳,益卫固表、托毒生肌、利水退肿的功效,是益气扶正的要药。黄芪皂刺粥把黄芪、皂刺和糯米组合在一起,故具有活血化瘀,消炎止痛,帮助消化,增进食欲,提神健身和提高机体免疫功能的功效。该方剂组成简单,配方容易,经济实惠,值得推广应用。