

药理作用可能与上述两味药有较强的清热止痛、解毒杀虫、抗菌消炎的作用有关。

经我们临床观察及实验研究,认为冰片的药物浓度在试用的五种型号的梅核油中,以20%的Ⅲ号油疗效最佳,实验室试验25%的梅核油其抑菌力与20%梅核油相同。因此,梅核油中冰片的最佳浓度为20%。

梅核油治疗急慢性脓耳均有良效,尤其对慢性脓耳急性发作者疗效更为突出。用药后痊愈时间最短为3天,最长者为25天,平均为10天左右。无论从总有效率或分别从痊愈率、明显好转率对比,梅核油均明显优于复方新霉素滴耳剂。且氨基甙类抗生素对内耳有毒害作用。而梅核油生产工艺简单,使用方便,价格便宜,经临床观察无一例出现毒副作用,因而具有较好的推广使用价值。

(本文承蒙张书彬副主任技师指导,谨致谢意!)

参 考 文 献

1. 杨 杰. 冰片核桃油治疗中耳炎. 新中医 1979; 2(2): 23.
2. 顾伯华. 中华外科手册. 第1版. 上海: 上海科学技术出版社, 1986: 437.
3. 刘玉璞. 冰片核桃油治疗化脓性中耳炎. 浙江中医杂志 1966; 2(2): 37.
4. 王德鉴. 中医耳鼻喉科学. 第1版. 北京: 人民卫生出版社, 1987: 46.
5. 李文亮, 等. 千家妙方. 下册. 第1版. 北京: 战士出版社, 1982: 395.
6. 江苏新医学院. 中药大辞典. 上册. 第1版. 上海: 上海人民出版社, 1977: 951.
7. 广东中医学院. 中医方剂学. 第1版. 广州: 广东人民出版社, 1973: 219.
8. 南京药学院《中草药学》编写组. 中草药学. 中册. 第1版. 南京: 江苏人民出版社, 1979: 672.
9. 江苏新医学院. 中药大辞典. 下册. 第1版. 上海: 上海人民出版社, 1977: 1547.

调理冲任汤治疗功能性子宫出血 436 例临床观察

第二附属医院 党 铎
包头医学院 第一附属医院 陶 颖

功能性子宫出血(简称宫血)属于中医学“崩漏”病证范畴。我们自拟调理冲任汤,随证加减治疗功血436例,收到满意的效果,现报道如下。

一般资料 436例中,其中门诊288例,住院148例;年龄:14~21岁120例,21~42岁97例,42~56岁188例,56岁以上31例。出血时间:1~3个月150例,3~6个月175例,6个月以上111例。出血量:以用卫生纸(规格 $18 \times 10\text{cm}^2$)为标准,轻度:每次约用1.5卷,出血量约为80~120ml,占126例;中度:每次约用2卷,出血量约为120~160ml,占218例;重度:每次用3卷以上,出血量约为200ml以上,占92例。不规则子宫出血者205例,月经过多而周期正常者116例,月经过频者84例,绝经后子宫出血者(经诊断而排外其它疾病)31例。

治疗方法 调理冲任汤由女贞子、旱莲草、桑寄生、川断、菟丝子、枸杞子、巴戟天、肉苁蓉各15g,炒山药30g组成。证见口苦咽干、目眩易怒者,加柴胡、黄芩各10g;经血紫黑有块、舌有瘀点者,加生蒲黄、五灵脂各10g;心烦失眠,烦热者加黄连10g、肉桂3g。

每日1剂,水煎服。10天为1疗程。

结 果 以血止和建立正常月经周期为标准。在436例中,服药2剂血止者106例,4剂血止者144例,6剂血止者82例,8剂血止者42例,10剂血止者18例,无效者44例,总有效率为89.91%。建立正常月经周期者317例,复发者占119例,继以调理冲任汤血止,建立正常月经周期者35例,无效者84例,总有效率达80.73%。

体 会 中医学认为肾(精)气为天癸之本,冲任之源,调节之枢。故方中以枸杞子、菟丝子滋肾补髓,桑寄生、川断补肝益阴,巴戟天、肉苁蓉益肾气,温肾阳;女贞子、旱莲草启肾水、壮元阴,山药健脾益气,以培后天气血生化之源。现代药理实验证实,补肾药调整阴阳是作用于垂体、肾上腺皮质系统,且具有促性腺功能,可以促使卵泡的正常发育及排卵,维持一定的雌激素水平,故可以认为本方之所以取效,是建立在调节人体内分泌系统,使下丘脑—垂体—卵巢功能恢复正常,从而达到止血和建立正常月经周期的作用。

(岳在文整理)