

- 学杂志 1987; 7(3):50.
6. 李向高, 等. 对人参不去芦问题的研究. 中成药研究 1981; 18:30.
7. 罗顺德, 等. 人参芦与人参根有效成分和药理作用的比较. 药学通报 1983; 18(8):22.
8. 沃兴德. 人参芦总皂甙对心脏功能的影响. 中药药理与临床 1987; 3(2):27.
9. 王本祥. 人参抗衰老作用的探讨. 中华老年医学杂志 1983; 2(1):58.
10. Phillips GB. Evidence for hyperestrogenemia as a

risk factor for myocardial infarction. Lancet 1976;

2:14.

11. 陈名道, 等. 男性糖尿病患者血浆性激素的变化及其临床意义的初步探讨. 中华内科杂志 1982; 21(2):71.
12. 张铁忠, 等. 男性冠心病患者血浆性激素水平与中医证候类型关系的研究. 中西医结合杂志 1983; 3(2):82.
13. 童钟杭, 等. 200名老年人血皮质醇的测定. 中华老年医学杂志 1984; 3(1):15.

加味防己黄芪汤治疗痛风高尿酸血症 伴发肾结石 2 例

四川省会理县中医院(四川 615100) 鲜光亚

例 1 李某, 男, 37岁。住院号: 3081。右踝关节红肿疼痛反复发作1年余, 复发1天, 于1987年8月5日收入住院。入院时右踝关节红肿灼痛, 行走困难, 腰痠痛, 苔略黄腻, 脉细数。血尿酸27.82mg%。治以加味防己黄芪汤: 防己12g 黄芪20g 青皮12g 陈皮12g 苍术20g 黄柏15g 知母12g 川牛膝15g 王不留行12g 赤芍15g 制川乌(先煎)6g 制草乌(先煎)6g 甘草3g。每日1剂, 水煎分3次服。同时控制进食高嘌呤食物。10剂后右踝关节肿痛消失, 仍感腰痛, 作B型超声波检查发现右肾结石3粒(直径约0.5cm)。上方去黄柏、知母、赤芍、川乌、草乌、甘草, 加郁金、威灵仙、三棱、莪术、鹿角霜、金钱草、石韦、滑石, 治疗20天后, 血尿酸降至18.75mg%。效不更方, 治疗期间时有菜籽大结石随尿排出。4个月后血尿酸降至5.87mg%, B型超声波检查右肾结石消失。停药半年后复查血尿酸为6.2mg%, 亦未见痛风性关节炎复发。

例 2 刘某, 男, 71岁。住院号: 2471。系肾结石(右肾1.8×1.4cm 1粒, 左肾绿豆大2粒)于1987年7月26日入院。治疗中出现右中指关节红肿疼痛, X线摄片见右中指中间指骨近端基底部骨质增生, 内缘骨质密度降低; 血尿酸19.1mg%。即改用加味防己黄芪汤治疗, 处方: 防己12g 黄芪30g 炒白术15g 青皮12g 陈皮12g 王不留行10g 川牛膝12g

威灵仙15g 郁金15g 鹿角霜(先煎)30g 金钱草30g 海金沙10g 广巴戟15g 菟丝子15g。每日1剂, 水煎分3次服。同时控制进食高嘌呤食物。1周后疼痛缓解, 2个月后, 血尿酸降至11.4mg%; B型超声波检查, 左肾2粒绿豆大结石消失, 右肾1.8×1.4cm 结石已裂解缩小为0.8×0.5cm 两粒。患者自动出院而中断治疗。

体会: 本文2例痛风高尿酸血症伴发肾结石患者, 由于本地缺乏排泄尿酸和抑制尿酸合成西药, 而单纯使用中药治疗。笔者根据中国中医研究院广安门医院泌尿科使用防己黄芪汤加青皮、陈皮、王不留行、川牛膝等治疗泌尿系酸性结石的经验〔新医药学杂志1975; (10):17〕, 试用于痛风高尿酸血症伴发肾结石患者, 不但对尿酸性肾结石有着明显的作用, 而且对高尿酸血症及痛风性关节炎也有着明显的疗效。本文2例经过较长时期的治疗, 血尿酸都有着明显的下降, 一般“单纯饮食控制仅能使血尿酸下降1mg%左右”(林兆耆, 等. 实用内科学. 第7版. 北京: 人民卫生出版社, 1983:990.), 说明本方有明显增加血尿酸排泄的作用。例1血尿酸降至正常, 停药半年后未见痛风性关节炎复发, 而且血尿酸仍基本正常。本方是否有改善抑制血尿酸合成的作用, 由于病例太少, 尚有待于进一步观察。