

瘀。因此各医家以舒肝、理气、活血化瘀为主治疗。本组病例与上述情况相符。但在临床上输卵管阻塞性不孕的患者中，大多有畏寒肢冷、少腹痛，得热则减等症状，证属阳虚寒凝。就不孕来说，认为胞宫寒冷，不能摄精成孕。本组报道的82例中52例兼有寒凝，《素问·调经论》云：“血气者，喜温而恶寒，寒则泣，不能流，温者消而去之”。因此，笔者以附子、肉桂温阳散寒，温养胞宫，温通血脉，促进全身的血液循环。从而改善输卵管血液流畅，促进去瘀生新，更加强了活血化瘀的作用。此52例兼有寒凝者疗效较为满意。

现代医学认为，输卵管不通的主要原因为瘢痕形成，使输卵管壁僵硬和输卵管周围粘连。而通过中药温阳、理气、活血化瘀之后，促进全身的血液循环，

从而改善了输卵管及其周围组织的生理效应，降低了炎性组织的侵蚀性，有利于炎症的吸收，粘连缓解，致使输卵管通畅，恢复其生理功能。

本组82例中有17例经用温阳疏通汤治疗后，输卵管仍未通畅。其中既往患各种结核病有7例，可能为输卵管结核所致的输卵管不通畅。故提示我们温阳疏通汤对该型的疗效不够满意，今后有待进一步探讨抗结核的有效方法。本文结果还说明，婚龄短、年龄小(30岁以内)、疗程长者疗效较好，余者疗效较差。故凡婚后2年未孕的患者，应全面检查，尽早明确诊断，尽早治疗，以取得更好的疗效。

(本研究承蒙本院妇产科及放射线科的大力协助，在此谨致谢意)

刺五加叶治疗Ⅱ°烧伤52例

贵州都匀军分区卫生所(贵州 558000) 戴余明 冯宗财

中国人民解放军56971部队 唐顺志

我们自1988年2月至1990年9月，采用刺五加叶粉治疗Ⅱ°烧伤52例，疗效显著，现报告如下。

一般资料 52例患者中，男性33例，女性19例；年龄14个月~54岁；烧伤时间2小时~7天；烧伤面积1~15%；烧伤深度：浅Ⅱ°28例，深Ⅱ°24例；伴创面感染16例；烧伤部位为头面、躯干和四肢。均为沸水、热气及火焰烧伤。

治疗方法 先将刺五加叶于铁锅内文火焙干呈黄褐色，研细末装瓶备用。用浓茶水或1:1000的新洁尔灭溶液冲洗消毒创面，去除粘附在创面上的异物，剪除水泡表皮，清除坏死组织及脓液。用无菌棉签或棉球拭干创面液体。然后在创面上涂一层桐油或菜油，将药粉均匀撒在创面上。以药粉不被桐油或菜油浸湿为度。再以无菌纱布覆盖包扎。2至3日换药1次。

结果 52例患者全部治愈。其中32例一次上药15分钟左右止痛，4至6天痂下一期愈合；18例7至14天脱痂痊愈。2例因治疗不及时，创面感染及全身症状较重，除每日换药1次，再以青、链霉素及庆大霉素肌注控制感染，于20天左右痊愈，未见瘢痕增生现象。

典型病例 张某，男，27岁，农民。1989年6月11日因被沸水烫伤腰背及双下肢2小时，送来我所诊治。患者自觉局部灼热，剧痛。查：腰背有数个融合成片，大小不等的水泡。双下肢外后侧表皮剥脱、创面

发红、潮湿、水肿明显。诊为浅Ⅱ°烧伤，面积15%。即用1:1000新洁尔灭溶液冲洗消毒创面，剪除水泡表皮及剥脱皮肤。然后于患部涂上桐油，均匀撒下药粉，无菌纱布覆盖包扎。约10分钟左右疼痛明显减轻。次日即能行走并可骑自行车外出。2天后复诊，局部肿胀消退，创面干燥，痂膜形成。按上法换药1次，4天后痂下一期愈合，6天脱痂痊愈，未留任何痕迹。

讨论 刺五加系五加科植物。据文献记载含有多糖甙等化学成份。具有增强机体对有害刺激因素的抵抗力，调节病理过程，有较人参更好的“适应原样”作用。已广泛用于临床。刺五加叶亦含有多刺木骨甙，具有舒筋活血，消肿止痛之功，但似未见治疗烧伤的记载和报道。Ⅱ°烧伤波及皮肤生发层和真皮层。如何减少创面渗出，有效止痛，防治感染，早期结痂、脱痂是临床对烧伤药物的要求。我们将刺五加叶粉配合桐油用于治疗Ⅱ°烧伤，其创面很快形成一层痂膜，能有效地保护创面，防止感染。52例患者中最短4天，最长2周即可脱痂痊愈，并无瘢痕增生。说明本药具有良好的止痛、抗炎、收敛、祛腐生肌及缩短病程的功用。其药源丰富，制备简单，使用方便，疗效确切，无毒副作用，是一种治疗Ⅱ°烧伤较为理想的外用药物，很适合基层，值得推广试用。