

能),行气活血(改善血行,降低毛细血管通透性和改善其脆性)而驱邪,祛风除湿,互相协同,起到抗变态反应的效果。同时,对久痒不瘥,皮疹不退的缠绵之症,配合外洗方药液擦洗患部,能促进局部组织新陈代谢,则收效甚速。

当归注射液治疗肋软骨炎34例

解放军一五一医院(河南安阳 455000) 贾开文

自1978~1989年3月笔者用当归注射液痛点封闭治疗肋软骨炎34例,并与西药组20例进行对照,疗效显著,现报告如下。

临床资料 本组54例中,男21例,女33例,年龄19~51岁,平均36岁。病程7天~12年,1月~1年42例占78%。病因:感冒引起16例,轻度外伤11例,病因不详26例。病变部位:第2肋24例,第3肋14例,第4肋6例,第10肋3例,第6、7、8、9肋各2例。左侧31例,右侧23例。剑突同时受累者5例。临床表现不明原因胸痛、肋骨部痛或上腹痛,局部压痛明显,患处轻度隆起36例,明显隆起15例,隆起不明显3例。血象、血沉、骨骼拍片均无异常。

治疗方法 随机分为当归组34例,西药组20例。当归组用当归注射液2ml,注射于痛点达骨髓。西药组用1%普鲁卡因2ml,维生素B₁₂1ml,注射于痛点达骨髓。两组均为7天1次,2次为1疗程。

结果 疗效标准以治疗两个疗程为限。治愈:自觉疼痛及压痛均消失,局部隆起恢复正常;显效:自觉疼痛及压痛消失,局部隆起缩小;有效:疼痛消失或轻微,压痛明显减轻,局部隆起无明显变化;无效:病情同前或症状复发。当归组:治愈30例占88.2%,显效2例占5.9%,有效2例占5.9%。西药组:治愈4例占20%,显效3例占15%,有效8例占40%,无效5例占25%。

随访 当归组34例中,随访1年以上30例,6~12个月2例,3~5个月2例,症状均未复发。西药组总有效者15例中,随访1年以上10例,6~12个月3例,3~5个月2例,其中症状复发者5例。

体会 肋软骨炎病因目前尚不清楚,可能与自身免疫有关。中医学认为系血瘀结聚,经络不通之故。本病目前尚无特效疗法。笔者采用当归注射液痛点封闭治疗取得显著疗效。当归可以活血、止痛、消肿。据现代医学研究,当归能增强巨噬细胞吞噬功能,促进淋巴细胞转化,改善血液循环,有抗炎、镇痛、抗损伤作用。该药治疗本病除上述作用外,与局部用

药亦有关。

柳豆叶治疗褥疮15例

解放军一八七中心医院外一科(海口 571159)

许声秀 姚淑萍

我院自1978~1979年用柳豆叶治疗褥疮15例,获得满意效果,现报告如下。

一般资料 本组15例中男性9例,女性6例;年龄35~68岁,平均42.5岁。褥疮部位:骶尾部8例,股骨大粗隆处4例,肩胛区2例,右臀部1例;Ⅰ度创面9例,Ⅳ度创面6例;创面最大6×8cm,最小3×2.5cm。

治疗方法 将采摘新鲜的柳豆叶15~20片洗净后以1%新洁尔灭浸泡20分钟;晾干后捣烂,创面以盐水棉球清洗洁净后,继以1%新洁尔灭消毒,在创面上敷一层纱布,然后将捣烂之柳豆叶涂在创面的纱布上,量以覆盖创面为宜,外加敷料包扎,避免创面受压,创面保持清洁、干燥、无皱,每日换药2次,创面结痂时不要强行剥离,以免撕伤新生肉芽组织。

结果 本组15例经外敷柳豆叶后全部愈合,治愈时间最长15天,最短7天,平均8.5天。Ⅳ度创面经治疗3天分泌和坏死组织均见消失并形成结痂,第5天明显结痂并部分脱落,6~8天结痂全部脱落而愈。Ⅲ度创面需5~6天脱痂而愈。

典型病例 吴某某,男,55岁。因车祸致伤,长期卧床治疗。骶尾部见一褥疮5×8cm,创面有黄色水样渗出液和少量脓性分泌物,有臭味,并有真皮层坏死组织达Ⅳ度褥疮。经用柳豆叶换药后第3天分泌物明显减少,肉芽组织新鲜,第5天坏死之组织消失,结痂形成,肉芽组织增生,第8天部分结痂脱落,第11天结痂全部脱落痊愈出院。

体会 柳豆叶,又名木豆叶,系海南民间草药。经临床观察此药有显著的抑菌、消炎、清热解毒、祛腐生肌作用,经细菌培养,作用类似庆大霉素,特别是对金黄色葡萄球菌的抑制力较强。经初步分析,水溶部分有抗菌作用,脂溶部分有抗炎作用。

外敷柳豆叶后生长的肉芽,较收颌液、1%呋喃西林液、抗生素液等外敷后所产生的肉芽更为鲜红而旺盛。因此,我们认为柳豆叶不但有杀菌、抑菌、消炎的作用,可能还有一种促细胞生长的营养因素。该疗法简便,疗效显著,无副作用,值得推广。