

胎盘组织液治疗慢性溃疡96例

湖北省鄂州市八一钢铁厂职工医院(湖北 436000)

张德宋

慢性溃疡是外科常见病,单用抗生素换药常效果不佳。我院自1986年6月以来用胎盘组织液换药治疗96例,效果良好,报道如下。

一般资料 本组96例,男71例,女25例。年龄7~68岁,平均38.9岁。病程32天~1.5年,平均72.6天。其中疖肿排脓后伤口久不愈合7例,III度烧伤创面长期不愈1例,慢性骨髓炎术后皮肤溃疡骨外露1例,术后伤口感染肌腱外露8例,软组织挫伤28例,冻伤13例,热压伤3例,高位截瘫合并III度褥疮4例,下肢胫前溃疡18例,踝关节溃疡12例,小夹板外固定致皮肤坏死1例。本组最大创面面积为 $41 \times 35\text{cm}$,最小面积为 $2.0 \times 1.2\text{cm}$,平均创面 $19.8 \times 13.6\text{cm}$ 。

治疗方法 在病因治疗的同时,溃疡处依次用双氧水、生理盐水、新洁尔灭清洁创面,拭净分泌物,依创面大小取胎盘组织液适量浸透纱布块填塞或覆盖创面,外盖一层凡士林纱条及敷料固定,一般2~3天换药一次。

结果 96例全部治愈。换药最少5次,最多的24次,平均10.7次。血液循环障碍者13例,平均18次治愈,平均愈合天数24.5天。原计划植皮的36例,平均12.5次治愈。治疗中病人无不适、无过敏反应,亦无感染扩散。一般用药1周左右基底部即出现健康的新生肉芽组织,坏死组织很快脱落。新生上皮沿肉芽表面迅速向创面中心生长。光学显微镜下见上皮发育正常,结构正常。

典型病例 王某,男,26岁。右足部因火焰烧伤III度,在外院曾用过烫伤药及抗生素近1个月,创面感染,来我院时仍有 $12 \times 6\text{cm}$ 溃疡面,呈灰白色,有少许分泌物。用上述方法换药,1周后创面即出现健康的新生肉芽组织,新生上皮沿肉芽表面迅速向创面中心生长,20天后创面愈合。

体会 慢性溃疡属中医学“疮疡”范畴,以阴证多见。是由于气、血、痰、火、湿蕴结,阻于经络,气血凝滞,生败化脓,久治不愈所致。根据“形不足者温之以气,精不足者补之以味”的治疗原则,宜温经散寒,养血,活血通络。胎盘性味甘、咸、温。具有补气、养血、益精之功能,故选用胎盘组织液治疗慢性溃疡是较为理想的。胎盘含有含氮多肽、氨基酸、多肽、胆碱、性腺激素等,通过几年来的临床观

察,笔者认为胎盘组织液治疗慢性溃疡的主要作用是:(1)改善了局部血液循环,增加了创面的营养,从而促进伤口的愈合。(2)增加了局部抗感染能力,提高治愈率。胎盘组织液治疗慢性溃疡,疗效好,药源丰富,价格低廉,无副作用,有推广价值。

热水坐浴按摩中极穴治疗癃闭23例

甘肃省临洮县中医院(甘肃 730500)

杨克文

笔者试用热水坐浴按摩中极穴治疗癃闭23例,取得较好疗效,现报告如下。

一般资料 本文23例,其中非阻塞性癃闭10例,男6例,女4例,年龄24~42岁,平均34.7岁;其中腰麻术后4例,产后4例,较长时间服普鲁苯辛、双氢克尿噻各1例。前列腺增生致癃闭13例,年龄54~68岁,平均62.8岁。病程36小时~5天,平均2.4天。23例均属急性发病,表现为小腹膨隆、胀痛,用力排尿点滴不通。

治疗方法 在浴盆内盛入热水,水深浸过耻骨联合上方10cm,水温 $43 \sim 48^\circ\text{C}$ 。水中加适量高锰酸钾,以防感染。每次坐浴15~20分钟,1日1~2次。坐浴时,用食、中、无名指指面,在中极穴部位做环形而有节律的抚摩,着力部分随腕关节连同前臂做盘旋活动。用力要轻柔、缓慢而协调。一般100~120 min/次为宜。前列腺增生癃闭,坐浴按摩排尿正常后,仍需间断治疗,巩固疗效。15次为1个疗程。

结果 疗效标准:痊愈:治疗1~3次排尿恢复正常;显效:治疗3次,排尿仍欠畅利,尿后滴沥,一个疗程后正常;好转:治疗3次,排尿仍费力,尿线细而滴沥,时间长,二个疗程后基本正常;无效:治疗3次后排尿仍点滴不通。非阻塞性癃闭治疗1次痊愈6例,2次痊愈3例,3次痊愈1例。前列腺增生癃闭显效9例,好转3例,无效1例。

典型病例 曹某,男,62岁。素患前列腺增生症,5日前因劳累排尿点滴不通,小腹胀急。施热水坐浴按摩中极治疗,5分钟后两次排尿1100ml。次日排尿仍不畅,继续治疗12次恢复正常。后因受凉,劳累排尿又欠畅利,遂坚持3~5日治疗1次。1年后随访未复发。

体会 热水坐浴可改善臀部、会阴部、小腹部局部血液循环,减轻前列腺充血、水肿,缓解尿道梗阻。按摩中极穴可使膀胱逼尿肌收缩,膀胱内压上

升。两法协同作用，能温经活络，行气活血，开通闭塞，膀胱气化有权，则小便得通。此法简单，易被患者掌握。

芩连仙鹤茅根汤治疗鼻衄

甘肃宁夏回族自治区人民医院(宁夏 731100)

王 中

笔者于1984~1988年用芩连仙鹤茅根汤治疗鼻衄患者244例，现总结如下。

一般资料 为了便于观察，将鼻衄按轻、中、重分为I、II、III度。I度为间断性渗血，每日出血量在10~50ml之间；II度为有明显的出血点，每日出血量在50~200ml之间；III度出血凶猛，鲜血从鼻腔及口腔涌出，数分钟出血量可达200ml以上，可能出现休克。将244例鼻衄患者按入院先后随机分为甲、乙两组。甲组122例，男85例，女37例；年龄6~71岁，平均29岁；病程40min~12天；平均49小时；I度鼻衄69例，II度36例，III度17例；鼻中隔粘膜出血87例，鼻腔动脉出血17例，后鼻道出血14例，血小板减少鼻衄2例，尿毒症、肝硬化伴鼻衄各1例。乙组122例，男83例，女39例，年龄7~68岁，平均28岁；病程30min~11天，平均51小时；I度鼻衄62例，II度41例，III度19例；鼻中隔粘膜出血90例，鼻腔动脉出血17例，右鼻道出血11例，血小板减少鼻衄2例，尿毒症、肝硬化伴鼻衄各1例。

治疗方法 甲组用黄芩15g 黄连6g 仙鹤草20g 白茅根20g，第一次加水700ml，煎煮30分钟，滤渣；第二次加水500ml，煎煮20分钟，滤渣；两次药液混合分早晚两次凉服。成人每日1剂，小儿6~14岁减半，<6岁为1/4剂，必要时行鼻腔局部止血处理。乙组按常规给止血药如：止血芳酸、止血敏、安络血，必要时行鼻腔局部止血处理。6天为1疗程。

结 果 疗效标准：痊愈：服药1疗程，鼻腔局部止血处理1次，停用药物及局部处理，鼻衄停止，观察2周无复发者。有效：用药1个疗程，鼻腔局部止血处理2次，停止用药及局部处理，仍有少许渗血，其鼻衄程度下降者。无效：症状无改善甚或恶化者。

甲组痊愈99例占81%，有效14例占12%，无效9例占7%。乙组痊愈51例占41%，有效20例占18%，无效51占41%。鼻衄程度：I度时疗效最好，甲组痊愈率达100%，乙组痊愈率55%；有效率21%；II度痊愈、有效率分别为：甲组64%及25%，乙组32%及

12%；III度较差，其痊愈、有效率分别为：甲组42%及29%，乙组21%及11%。两组比较有显著差异 $P<0.01$ 。

体 会 中医学认为：“阳络伤则血外溢，血外溢则衄血”。《灵枢·百病始生篇》：“心气不足者，心中之阴气不足也。阴不足则阳独盛，血为热迫，而妄行不止矣，……泻其心之热，而血自宁。”本方中黄芩善清肺热，黄连泻心火，仙鹤草止血，白茅根凉血、止血。现代医学认为黄芩、黄连、仙鹤草、白茅根具有抗炎、止血功能。通过临床分析，我认为本方是一种抗炎止血剂。对鼻衄患者，如果用药时机及适应症选择适宜，可起到辅助止血作用。当全身凝血机制正常，伴有热性疾病的鼻衄患者，用药效果显著。但对有严重肝、肾功能衰竭伴有全身凝血功能障碍而鼻衄时，还应采取其它积极措施。

中西医结合治疗过敏性鼻炎42例

空军杭州疗养院(杭州 310007)

于建平 王志峰

我们自1988年2月~1990年12月，采用中西医结合治疗过敏性鼻炎42例，取得满意疗效，现报告如下。

一般资料 本组82例患者，均按照《鼻科学》(上海人民出版社，1977:331)诊断标准确诊。随机分为两组：治疗组：共42例，男35例，女7例；年龄26~48岁，平均37.5岁；病程2~12年，平均4.8年。对照组：共40例，男37例，女3例；年龄22~50岁，平均35.2岁；病程3~15年，平均5.4年。两组一般情况无显著差异。

治疗方法 治疗组：采用西安康华制药厂生产的鼻腔去敏膜(主要为色甘酸钠、盐酸麻黄碱和醋酸氟美松)，每次1片，贴于下鼻甲上，每日2次；口服汉口中联制药厂生产的鼻炎片(主要为苍耳子、辛夷花、野菊花、五味子、白芷、防风、连翘、荆芥等)，每次0.9g，每日3次。8天为一个疗程。对照组：口服鼻炎片每次0.9g，每日3次，10天为一个疗程。

结 果 疗效标准：显效：鼻痒、喷嚏、流鼻涕、鼻塞四大症状消失或基本消失，鼻粘膜苍白水肿基本恢复正常。好转：鼻痒等四大症状明显减轻，鼻粘膜苍白水肿基本消失。无效：症状无明显改善。结果：经1~2个疗程，治疗组42例中，显效18例占42.9%，好转21例占50.0%，无效3例占7.14%；总有效率为92.9%。对照组40例中，显效8例占20.0%，