

院报道为9.5~24.3%，山西医学院一附院报道为31%。本组病例发生率仅8.62~5.17%。较以上各单位报道明显为低。说明应用温阳利水法治疗肺心病心衰，减少了呼吸合并代碱的发生率。

肺心病心衰，属中医心脾肾阳虚水泛型，因肾阳虚衰，无力温养脾阳，水停心下，水气凌心，水饮内停，溢于肌肤，治以温阳利水之法。苓桂术甘汤及真武汤乃张仲景治水饮良方。除根据中医辨证外，经现代医学研究证实⁽⁵⁾，附子的强心作用胜过洋地黄及樟脑，干姜、甘草能加强其治疗作用，减弱其副作用。附子与茯苓、白术合用为强心利尿剂，可用于心脏病水肿等，可见以上中医论治与现代医学对心衰治疗的原则也基本一致。

本组总有效率达89.65%，疗效较好。血气分析

中西医结合治疗臀深部化脓性感染反复发作1例

济南变压器厂职工医院(济南 250022) 彭德明

病历简介：姚某，女，57岁，农民。9个月前后臀部肌肉注射青霉素，3天后注射部位疼痛加重，10天后局部红肿，压痛，有脓水流出。经消炎，局部清创，油纱条引流，反复发作6次。1991年2月8日住某部总医院外科32天出院，4月4日复发，拟进行深部病灶切除术，次日来我院治疗。体检：老年女性，发育营养好，T37.5℃，BP17/11kPa，心、肺正常，肝脾未及，脊柱、四肢无阳性发现。右臀部注射区，有12×10cm肿胀区，皮色暗红、热、质硬，触痛明显，中心有0.6×0.5cm凹陷性创口。实验室检查：Hb125g/L，WBC $7.2 \times 10^9/L$ ，中性74%，淋巴26%，血沉14mm/h，尿常规、肝功能检查正常，胸部X线透视阴性。

治疗经过：常规消毒，从创口处用无菌探针向内下方探及8cm无阻力。扩创后有13ml脓性物流出。因感染灶向内下，下橡皮条引流3天仍有脓液积留。第4次换药改用大号玻璃火罐在创口处拔罐，留罐10min，吸出红白相间伴有坏死组织脓液7ml，下橡皮条引流，无菌纱布覆盖。第7次换药拔掉引流条，创口处再次拔罐，留罐10min，吸出暗红色血液3ml，10min内凝成血块。局部消毒，无菌纱布覆盖。

同时用蛇蜕10g，全蝎10g焙黄存性研末，黄酒冲服，日服1次，连服20天，肿胀消失，皮色恢复正常，经6个月随访无复发。

体会：臀深部化脓性感染，橡皮条引流无异物残

结果证实，患者的二氧化碳潴留和低氧血症都有较明显的改善，无严重的酸碱失衡并发症发生，证实了温阳利水法在肺心病心衰治疗中的良好前景。

参考文献

1. 慢性肺原性心脏病诊断标准。中华结核和呼吸系疾病杂志 1978; 1(1):56。
2. 慢性肺原性心脏病疗效判断标准。中华结核和呼吸系疾病杂志 1978; 1(1):58。
3. 全国第五次肺心病专业会议纪要。中华结核和呼吸系疾病杂志 1988; 10(11):3。
4. 慢性肺心病的防治。第一版。北京：人民卫生出版社，1975:102。
5. 张子彬。心力衰竭。第一版。济南：山东科学技术出版社，1986:248。

留之弊。创口处拔火罐，具有疏通气血，消散瘀阻，罐内形成强负压，有良好的托毒排脓功效。蛇蜕解毒消肿，治痈疽恶疮，全蝎解毒疗疮，善治疮疡肿痛。两药配伍，相得益彰。黄酒温通，可助药力畅达经络。

痛舒宁贴敷治疗血管球瘤2例

北京医科大学人民医院(北京 100000) 李华恩

胡某，男，60岁。1988年4月左侧足心部出现一蚕豆大小肿瘤，走路时能引起剧疼，曾在外科门诊检查，诊断为血管球瘤，患者不愿手术治疗，遂给予痛舒宁贴敷剂贴病灶，3周后血管球瘤即消失，至今未再复发。

李某，女性，55岁。1989年6月右侧足心部出现一黄豆大小肿物。不疼，以后肿物逐渐肿大，约蚕豆大小，触之硬感，行走时剧疼，外科诊断为血管球瘤，患者不愿手术治疗。用痛舒宁贴在患处，两周以后血管球瘤消失，未再复发。

血管球瘤来源于血管外皮，有血管球器官样结构的良性肿瘤，常因剧痛影响工作和睡眠，一般用外科手术切除。上述2例患者用痛舒宁治疗后达到了止痛、消肿、最后血管球瘤消失，彻底治愈的效果。

痛舒宁是用氯化钾制成的贴敷剂，为乙酰胆碱脂酶的激动剂作用于穴位或体表部位起到治疗作用，激动剂疗法有一定的镇痛、止痒、消炎、消肿、镇咳、止血的作用。激动剂对其他酶也可能有激活作用，它们镇痛、镇咳作用有很明显的表里相关或体表内脏相关的经络现象。提示经络现象和疼痛、咳嗽的发生、缓解，均可能与神经介质，某些活性物质及其酶的动态变化有关，值得进一步研究与探讨。