

用与皮肤分泌液接触形成硫化碱，可以有软化皮肤，促进药物吸收。该药与葛蒲合用具有消炎、杀虫之作用。水蛭含有水蛭素，它能抗凝破瘀，通经；斑蝥能攻毒蚀疮，破血散结；酒能扩张局部血管。局部应用该药后，改善因苔癣性变和长期搔痒刺激所致的局部血管收缩，血液循环不良，提高了局部抗病能力，促进痊愈。故本方能使顽固性的神经性皮炎迅速得到治愈。

本药方有毒，只限于外用，勿口服。在配制该液时勿超剂量，否则外用时可能使局部起泡。按操作规程使用目前尚未见到毒副作用。

伤湿止痛膏佐治毛细支气管炎40例

云南省凤庆县北院儿科 (云南 675900)

陈建聪

毛细支气管炎是儿科常见的一种特殊型肺炎。近5年来，我科在西药治疗的同时，加用伤湿止痛膏贴敷肺俞穴位，观察到在止咳平喘和促进罗音消失方面有一定疗效。现报告如下。

一般资料 本组40例中，男23例，女17例。年龄<6月14例，6~1岁10例，1~1.5岁5例，1.5~2岁11例。病程1~7天，平均2.05天。其中普通型36例，重型3例，极重型1例。对照组25例中，男14例，女11例；年龄<6月11例，6~1岁6例，1~1.5岁5例，1.5~2岁3例。平均病程1.92天；普通型23例，重型和极重型各1例。

诊断标准参照刘继忠等编的《儿科疾病诊断标准》(国外医学儿科分册 1984; 1:封4)。分型参照张梓荆报道(急性呼吸道感染信息 1989; 3:11)。

治疗方法 对照组以静脉滴注氨茶碱(1~2 mg/kg及氯化可的松(4~8 mg/kg)，口服病毒灵、止咳药等。治疗组是在对照组治疗的基础上，加用伤湿止痛膏(上海中药制药三厂产品)1帖敷贴于双侧肺俞穴，每日1次，每次贴12h，3次为1疗程。两组病例均每日给予青霉素5~10万u/kg，分2~4次肌肉注射；有心力衰竭者给强心剂，呼吸困难者吸氧，发热者给予退热处理。两组均以治疗6天内判断疗效。

结果 疗效标准：显效：用药1~3天后喘憋、哮鸣音消失和湿性罗音减少；有效：喘憋显著改善，哮鸣音及湿性罗音减轻或者6天内喘憋及罗音基本消失者；无效：喘憋不改善，病情如旧者。结果：治疗组显效25例(62.5%)，有效12例(30%)，无效3例

(7.5%)总有效率92.5%；对照组显效12例(48%)，有效5例(20%)，无效8例(32%)，总有效率68%。治疗组总有效率高于对照组，两组有显著差异($P<0.05$)。前者有效的疗程平均为1.8天，比后者(3.1天)缩短1.3天。其中11例贴敷1次即见效。

体会 伤湿止痛膏中的川乌、草乌、干姜、山奈、肉桂温经止痛；马钱子和老鹳草通络；肉桂、骨碎补、乳香、没药活血化瘀，扩张血管，促进血液循环；干姜温肺化痰止咳，与山奈同除胸满；荆芥、防风疏散风寒，解热镇痛；白芷祛风燥湿消肿，兴奋中枢神经，并与骨碎补、丁香同有抗菌作用；肉桂、乌头补肾有利于激素的撤减；五加皮有强心作用。诸药与颠茄浸膏、樟脑、薄荷脑等中西药合璧，共奏温肺祛风、除痰、活血化瘀之功效。共同解除肺微循环障碍，改善肺部血液循环，加速肺部炎症吸收，解除支气管痉挛，缓解通气障碍，从而起到控制喘憋和促进罗音消失的作用。同时，通过在穴位上贴敷，药物易由皮肤渗透进入穴位经络，经过经络气血的运行作用到达有关脏腑，发挥止咳平喘、抗菌抗病毒、消失罗音之作用。该药药源广、价廉，给药途径方便，易为患儿接受，是农村基层医院值得探讨研究的一种治疗方法。

复方活血汤治疗泰齐氏综合征25例

湖北省大冶县保安医院 (湖北 435115)

李名山 刘道汉

泰齐氏综合征，又名肋软骨炎。我院自1981年10月~1986年10月运用中药复方活血汤治疗25例，疗效满意，现报告如下。

一般资料 本组25例中男14例，女11例。年龄：28~57岁，平均年龄39.6岁。病程在1个月内就诊者12例，1个月~0.5年内9例，0.5~1年内4例。11例在发病前有上肢劳损史，9例有上呼吸道感染史，另5例无明显诱因。左侧15例，右侧10例，大多数侵犯第2~3肋软骨，病变区隆起伴疼痛和局部触痛，直径2~5cm。查血常规及血沉均正常，胸片无异常。

治疗方法 口服复方活血汤：当归10g 桃仁10g 薤白头10g 红花5g 柴胡15g 延胡索5g 乳香5g 木香6g 炙甘草6g。每日1剂，连服7剂为1疗程。一般3~5个疗程，最长者7个疗程。

结果 疗效标准：治愈：服药后疼痛停止，肿块消失，随访1年以上未复发者。显效：服药后疼痛