

以上各项均无好转或有恶化。

2. 治疗结果 本组12例中治疗后显效9例, 有效3例。治疗取效最短7天, 最长12天。均未见明显副作用。停药后随访1~3年12例, 均未见复发。

讨论

本组病例均有周围血中嗜酸性粒细胞增多, 累及的食管及胃肠部位有大量嗜酸性粒细胞浸润和血清中IgG、IgA增高。现代医学已证明“肾”与机体免疫功能有关。药物作用表明补肾药物作用于垂体-肾上腺系统, 可增强肾上腺皮质功能或具有肾上腺皮质激素样作用, 而没有激素的副作用。故应用枸杞子、菟丝子、骨碎补, 补骨脂以补肾。乌梅、浮萍有抗过敏、抑制嗜酸细胞增高, 调节交感神经和副交感神经作用。黄连、板蓝根以清热解毒, 抑菌消炎, 抑制嗜酸细胞增多。实验证明甘草含甘草甜素及甘草次酸, 有肾上腺皮质激素样作用, 有抗炎抗变态反应作用。上述诸味药对嗜酸细胞性食管炎起治疗作用, 故疗效较满意。

益气活血凉血法治疗色素性紫癜性苔藓样皮炎34例

长沙市中医院(长沙 410002)

黄河 文漫红

笔者采用益气活血凉血法治疗色素性紫癜性苔藓样皮炎34例, 取得良好的效果。现总结如下。

临床资料

一、一般情况 34例患者中, 男性29例, 女性5例; 年龄在28~63岁之间。有21例作组织病理切片检查。皮损发病部位: 双下肢皮损5例, 单侧下肢28例, 右前臂上部1例; 病程: 最长14个月, 最短为4天。

二、诊断标准 皮损为紫红或棕褐色, 呈不规则圆形, 晚期可融合成片, 可见瘀点、瘀斑, 针尖或粟粒状血疹。皮损边界清楚, 有轻度苔藓样变, 并有少量鳞屑, 压之不褪色, 伴有瘙痒。以下肢小腿多见, 病程呈慢性, 常见于成年男性。皮损组织病理显示, 真皮乳头层内毛细血管周围有以淋巴细胞为主的炎性细胞浸润, 血管周围有较多的含铁血黄素沉着。有时可见毛细血管轻度扩张。表皮棘层肥厚, 细胞间水肿, 并有炎性细胞渗入。有时基底细胞液化变性。

治疗方法

药物组成: 红参4g 生黄芪15g 生地10g 当归10g 丹皮10g 赤芍10g 黄芩6g 银花10g 地肤子15g 炙甘草6g。加减: 脾虚者加陈皮, 炒白

术健脾益胃; 肝旺者加炒白芍、柴胡、防风平肝疏肝; 湿热甚者加土茯苓、萆薢、苦参清热利湿; 寒滞经脉者去生地、丹皮、赤芍、黄芩, 加白芥子、肉桂、鹿角霜温阳通络; 阴虚火旺者加石斛、麦冬、元参养阴清热; 正气不足者倍用红参, 配合扶正托毒之品。水煎剂, 文火煎熬30min, 每剂两煎, 早晚各服1次, 停止其他所有治疗方法。以10天为1个疗程。

结果

一、疗效标准 以3个疗程为限, 皮损完全消退者为痊愈; 皮损有改善, 色素减退, 苔藓化减轻, 或时愈时差者为有效; 连续治疗3个疗程皮损未消退者为无效。

二、疗效统计 在1个疗程内痊愈者9例, 有效18例, 无效7例; 治疗2个疗程痊愈者12例, 有效9例, 无效4例; 治疗3个疗程痊愈者4例, 有效6例, 无效3例。痊愈率占73.5%, 有效率占17.7%, 无效率占8.8%。从治疗情况可以看出2个疗程内痊愈者21例占61.7%, 治疗时间在7~14天内痊愈者较多。对于病程较长者, 必须坚持服药, 才能达到痊愈的目的。

体会

本方中红参、黄芪益气而助血, 气行则血行, 补气而不伤阴, 气机条畅则瘀血自解; 当归、生地、丹皮、赤芍活血凉血, 黄芩、银花、地肤子清热熄风化斑, 诸药配伍共助益气祛瘀消斑之效。临床上根据不同情况, 辨证论治, 灵活变通, 每能取得良好的疗效, 使离经之血回归血脉, 瘀血去则新血生, 斑消疹退, 自获痊愈。

紫霜治疗Ⅱ°烧伤120例

解放军第98医院(浙江湖州 313000)

李克荣 郑冠吾 邱文娟

1987年以来, 我院用自制的“紫霜”治疗Ⅱ°烧伤120例。经临床观察, 对创面无刺激性, 抗感染作用强, 创面愈合快, 疤痕少, 效果满意。报道如下。

临床资料

患者组120例, 男99例、女21例。平均年龄25.8岁(9个月~72岁)。烧伤深度按三度四分法属浅Ⅱ°或深Ⅱ°; 烧伤面积按新九分法, 平均面积12.1%(2~67%)。按1970年全国烧伤会议分类标准, 轻度烧伤58例, 中度烧伤47例, 重度烧伤13例, 特重度烧伤2例。其中热水烫伤55例, 火焰烧伤30例, 石灰水烧伤26例, 其他烧伤9例。

治疗方法