

后,瘤体变软,继而缩小;继服一个疗程,瘤体消失,且与病程关系不大。对其中18例经2年以上随访,均无复发。个别患者服药过程中有胃部不适,对症处理即可,勿需停药。

讨 论

结节性甲状腺肿是一个常见病,它的发生与患者遗传素质、碘缺乏、生长刺激(TSH)等因素有关。中医学多责之于肝,行气散结是其治则,采用滋补肝肾的知柏地黄丸治疗却鲜有报道。笔者认为:肾为先天之本,藏精生髓,经络“循咽喉”。病理生理在丘脑-垂体-甲状腺轴等内分泌系统中具有重要作用。近代研究证明:六味地黄汤可以维持荷瘤动物的甲状腺功能,能改善荷瘤动物机体免疫、代谢、造血及甲状腺功能,对突变和癌变皆有一定防护作用。临床上甲状腺良性结节大部分是温热结节,不同程度地存在着阴虚阳亢的表现,加用知母、黄柏,一则合乎治瘤清热解毒之法;二则双向调节,燮理阴阳,以平为期,较六味地黄丸更为妥贴,故而疗效显著。

云南白药治疗新生儿脐炎75例

山东聊城市人民医院儿科(山东 252000)

李建民 张玉先 张洪英 马宝银 段玉林

脐炎是新生儿常见病、多发病。我们根据民间验方于1985~1989年间对75例新生儿脐炎患儿给予云南白药脐部换药治疗,并进行对照观察,疗效较好。现报道如下。

资料与方法

一、病例选择 全部患儿诊断均符合小儿内科学标准(上海第二医学院、北京儿童医院主编,小儿内科学,第1版,北京:人民卫生出版社,1980:190),共计153例,男81例,女72例,年龄2~5天26例,5~10天79例,10~15天43例,15~28天5例,153例中102例有1~3个伴发病,其中硬肿症25例,缺血缺氧性脑病42例,颅内出血4例,肺炎39例,

化脓性脑膜炎8例,婴儿肝炎综合征12例,低血钙症16例。入院前对脐炎均未做任何治疗。

二、分组 153例随机分为两组,云南白药治疗组(简称治疗组)75例,一般治疗对照组(简称对照组)78例。两组患儿在年龄、性别、病情、病程、并发症等方面情况基本一致,经统计学处理 P 均 >0.05 ,具有可比性。

三、治疗方法 治疗组:30~50%酒精或白酒清洗脐部后,上敷云南白药(云南白药厂)0.25~0.5g,每日1次,直到治愈;对照组:3%双氧水及75%酒精分别洗涤脐部后涂以2%龙胆紫,每日1次,直到治愈。

结 果

治愈标准:脐部红肿消退,干燥无分泌物,脐带干燥脱落为治愈。

临床疗效:两组患儿全部治愈。治疗组病程最短1天,最长4天,每天治愈例数依次为:12、44、15、4例;对照组病程最短2天,最长6天,每天治愈例数依次为:0、6、19、23、16、14例。经统计学处理, $P<0.01$,差异有显著性意义,治疗组疗效明显优于对照组。

毒副作用及其他:云南白药治疗组在连续用药过程中及治愈后均未发现任何毒副作用;相反,对伴有渗血及肉芽组织增生者疗效甚好。

讨 论

新生儿脐炎是由金黄色葡萄球菌、大肠杆菌及溶血性链球菌等感染脐部而引起的局部炎症。一般治疗为局部用3%过氧化氢溶液及75%酒精洗涤,并涂以1~2%龙胆紫。根据临床观察,涂龙胆紫后,表面干燥、结痂,里面形成脓液而不易及时发现而使脐炎迁延不愈。云南白药具有活血化瘀、消肿定痛之功能,广泛用于人体内外损伤、出血及红肿疮毒。本文结果表明云南白药不仅对脐炎疗效确实,而且较目前的一般治疗能减少换药次数、缩短病程,亦未发现任何毒、副作用,并且对伴有渗血及肉芽组织增生者疗效甚好,值得推广。

· 消 息 ·

浙江省中西医结合学会精神病专业委员会第二届学术交流会议于1992年10月6~8日在浙江省普陀沈家门召开。参加会议的代表共39名。省、市有关领导到会并作了重要讲话。会议学术气氛活跃,形式多样。会议共收到论文33篇,其数量和质量均较以往有所提高。论文选题新颖,设计严谨,资料范围广泛,除注重精神病临床内容外,也涉及神经症、中医心理学等领域研究。