

的机理之一。

蝥蛇毒能激活X因子引起凝血。RVV-CT测定需要外源性磷脂的存在, RVV-RT测定则依赖患者自身血小板上PF₃的活力。当血小板总数正常时, RVV-RT延长, RVV-CT正常, 说明患者PF₃有效性降低⁽⁵⁾。五叶参能延长KPTT、PT、TT、AT、RVV-CT、RVV-RT, 说明该药降低多种凝血因子活性; 而对RVV-RT的延长明显超过对RVV-CT的作用, 反映了该药尚能抑制PF₃活性。

红细胞电泳速度的快慢主要取决于红细胞表面的负电荷量, 并间接反应红细胞的聚集性。五叶参具有加速红细胞电泳速度的作用, 提示该药能抑制红细胞聚集作用。

众所周知, 血小板聚集功能、PF₃活性、凝

血因子活性、红细胞聚集功能增强都是导致体内血栓形成的重要因素。五叶参对上述各环节的抑制作用, 提示该药具有较全面的抗血栓形成效应。实验证明, 五叶参能减少体外血栓形成的长度、湿重、干重, 为临床用于防治血栓病提供了部分客观依据。

参 考 文 献

1. 周和平, 葫芦科绞股蓝的皂甙成分与药理, 药学通报 1988; 23(12): 720.
2. 陈 珏, 植物药绞股蓝在日本的研究概况, 浙江药学 1986; 3(4): 33.
3. 马幸福, 等, 绞股蓝皂甙对家兔血小板聚集性影响的电镜观察, 西安医科大学学报 1988; 9(4): 330.
4. 申京建, 等, 人参总皂甙对¹⁴C-花生四烯酸在兔血小板中代谢的影响, 药学学报 1987; 22(3): 166.
5. 周衍椒, 等, 止血生理与临床, 第1版, 北京: 人民卫生出版社, 1987: 147-148.

中药洗剂与洁病搽剂治疗尖锐湿疣 24 例

四川省军区后勤部(成都 610021) 王兴周

我们自 1990 年以来, 采用自己配制的中药洗剂与洁病搽剂治疗尖锐湿疣 24 例, 获得满意效果。现报告于下。

临床资料 24 例均经病理及外阴病变涂片检查确诊。男 9 例, 女 15 例, 均为已婚, 年龄 21~41 岁。病期 2 个月~1 年, 平均 3 个月。疣体直径<0.4 cm, 呈小丘疹性损害 10 例。直径为 0.5~1.0 cm, 呈疣状增殖性损害 6 例。直径>1.0 cm 以上, 呈菜花状损害各 4 例。发生部位: 阴茎龟头 2 例, 阴茎冠状沟 5 例, 阴茎系带 2 例, 阴茎包皮 2 例, 肛门 3 例, 处女膜残留 1 例, 会阴及阴蒂 6 例, 小阴唇内 7 例, 尿道口周围 2 例, 阴道口 2 例。

治疗方法 中药洗剂组成: 明矾、白藓皮、黄芩、板蓝根各 30 g, 蛇床子、川椒、地肤子、芙蓉花各 15 g。上药用纱布包裹, 加水煎至 2000 ml, 将药渣提出。待煎药液温度降至 40℃ 左右时, 将患部坐入盆中, 边坐浴边用纱布蘸药液反复揉擦洗患部, 每剂早晚各洗 30 min。

洁病搽剂: 5% 新洁尔灭溶液 100 ml 中加入三氮

唑核苷 15 g, 溶解摇匀后可用。待中药洗擦干后, 以 1% 新霉素软膏涂于疣体周围, 保护疣体周围的正常皮肤。然后用棉签蘸洁病搽剂点涂疣体表面, 使之稍微发白, 每日 2 次, 10 次为 1 个疗程。

结 果 疣体直径在 0.5 cm 以下的小损害, 涂药后在第 1 个疗程内逐渐萎缩至脱落。疣体直径在 0.6 cm 以上的损害, 均在第 2 个疗程内逐渐萎缩至脱落。全部患者均治愈, 最短为 4 天, 最长为 20 天, 平均 9.8 天。本组 24 例, 随访 0.5 年者 10 例, 1 年者 6 例, 2 年者 5 例, 失访者 3 例, 随访 21 例全部治愈。

体 会 用中药洗剂与洁病搽剂合用治疗尖锐湿疣, 疗效满意, 且方法简便、无副作用。中药洗剂中蛇床子含 1-萜烯异缬草酸龙脑酯, 地肤子含皂甙, 均对病毒有抑制作用; 板蓝根、白藓皮等具有抗病毒作用, 配合芙蓉花及黄芩具有清热解毒、逐瘀、祛风、利湿作用。使用洁病搽剂时, 应注意蘸液不宜过多, 不宜沾染正常组织。每日不超过 2 次, 过多易造成局部溃破。搽药时有轻度疼痛, 不影响效果。搽药后待局部凉干, 用棉签蘸去残余药液, 患部防止摩擦。