

食管炎应包括哪些具体措施尚不够明了。药物治疗方面：消胆胺可以与胆盐结合，理论上是比较理想的药物，但也有人认为对丧失了幽门括约肌的患者并不好。胃复安的作用机理在于加速胃的排空作用。吗丁啉为外周多巴胺受体阻滞剂，可直接作用于胃肠壁，增加食管下部括约肌张力，从而防止胃、食管返流，促进排空。中医认为胃癌术后胆汁返流的机理主要是中气虚弱，升降失调，胆汁上逆。黄连片由黄连、吴茱萸、木香组成，方中黄连配吴茱萸，辛开苦降，更佐以木香，长于行滞气。此药久服无副作用。

冻疮搽剂治疗冻疮 106 例

山东省临沂卫生学校(山东 276000)

金光泉 王汝信

山东省临沂市第一人民医院 张 岩

近年，笔者自拟中西药冻疮搽剂治疗冻疮 106 例，疗效较满意。现报告如下。

临床资料 收治冻疮患者 106 例，男 40 例，女 66 例；年龄 4~55 岁，平均 37.5 岁；手部 56 例，足部 40 例，面部和耳廓各 5 例；轻者 46 例，较重者 53 例，严重者 7 例；初发者 15 例，复发者 91 例；曾用冻疮膏治疗效果不明显者 14 例；病史最长者 12 年，平均发病 3.6 年。

治疗方法 取芫花 7.0 g、红花 3.5 g 同泡入 75% 乙醇溶液 100 ml 中，半月后取其滤液，加 654-2(针剂)5 mg 及甘油 35 ml，摇匀密闭备用。治疗时先将患部洗净，用棉签蘸取药液稍用力擦患处，每日 3~4 次。

结果 106 例均痊愈，平均用药 3.5 天。用药 35 min 止痒，搽 2~3 次即止痛、消肿。轻者搽 1~2 天痊愈；较重者 3~5 天痊愈；严重者 3~5 天结痂，6~8 天痊愈。另对 21 例往年患者的预防性治疗，取得了当年未复发的效果。

典型病例 焦某某，女，20 岁，学生。于 1992 年 1 月 23 日就诊。患者已连续 3 年发生冻疮，就诊时双手背有散在性肿块，灼热和痒感已 17 天，部分肿块中心已形成水疱或溃疡，溃疡面直径约 0.5~1.0 cm，其中一处有少许脓性分泌物。经冻疮搽剂和抗菌治疗，5 天内结痂，7 天痊愈。

讨论 方中芫花可消肿解毒、活血止痛；红花能活血通经、祛瘀止痛；654-2 扩张皮肤血管、改善微循环、增加温度、纠正缺氧状态。乙醇可消毒、防止皮肤糜烂和止痒，甘油能保湿、延长用药时间、吸收组织间隙水分、减轻水肿等，以起辅助作用，从而

达到治疗冻疮的目的。但对已形成溃疡面者，须用红霉素眼膏涂抹溃疡面，然后在其周围擦药液，以免乙醇直接刺激溃疡面而引起灼痛。治疗期间对患处应注意保温。

化疗反应的中西药防治

山西医学院第一附属医院(太原 030001)

赵瑛 高素媛

我院自 1988 年 5 月~1992 年 12 月对 28 例癌症术后化疗药物反应的患者行中西医结合治疗，疗效较满意。现报告如下。

临床资料 (1) 中西医结合组(中西组)：28 例均为根治性手术后患者，其中胃癌 11 例，结肠癌 8 例，乳腺癌 9 例。男 16 例，女 12 例，年龄 42~75 岁，平均 58 岁。(2) 西药组：24 例均为根治性手术后患者，其中胃癌 9 例，结肠癌 7 例，乳腺癌 8 例。男 14 例，女 10 例，年龄 35~72 岁，平均 57 岁。全部病例术后基本恢复后开始采用二种以上药物联合化疗，每一病种化疗方案基本相同。所用药物：5-氟脲嘧啶、丝裂霉素、氮甲蝶呤、环磷酰胺、阿霉素等。化疗期间患者均出现不同程度药物反应：食欲不振、恶心、呕吐、腹泻、乏力、口舌糜烂、白细胞降低、皮疹等等。

治疗方法 (1) 中西组：化疗同时开始服药。西药：常规量口服胃复安、吗丁啉、维生素 B₆、维生素 B₁、鲨肝醇；隔日静脉滴注葡萄糖、白蛋白、复方氨基酸、新鲜血浆等。中药：以补气血、健脾和胃、降逆止呕为原则，用十全大补汤加橘皮竹茹汤加减。方药组成：党参 12 g 白术 10 g 黄芪 12 g 熟地 2 g 当归 10 g 炙甘草 6 g 茯苓 10 g 白芍 10 g 川芎 6 g 肉桂 3 g 淡竹茹 20 g 橘皮 10 g 红枣 20 g 焦三仙各 12 g，每日 1 剂水煎服。(2) 西药组：只用前述西药，治疗时间相同。

结果 显效(食欲不振、恶心、呕吐、腹泻、乏力等症基本消失，可按期完成化疗)中西组 10 例，西药组 5 例。有效(上述症状减轻，化疗可按期完成或化疗用药间隔时间延长，但仍能完成化疗)中西组 17 例，西药组 11 例。无效(上述症状不能缓解，化疗被迫停止)中西组 1 例，西药组 8 例。总有效率中西组 96.43%，西药组 66.67%，两组比较差异有显著性意义($P < 0.05$)。

体会 十全大补汤加橘皮竹茹汤可以补气血，扶正固本，振奋脾阳，提高机体免疫功能，机体承受化疗反应的能力增强，使抗癌化疗药物能更好地发挥作用。