

保护肝细胞，促使肝功能恢复的作用；以赤芍、丹参、鳖甲活血化瘀软坚，改善门静脉血流及肝脏微循环，促进纤溶功能，有利病灶的修复和肝细胞的再生。国内外研究表明血清 HA 可作为一种进行性肝损害的生化标志物<sup>(3)</sup>，反映了肝病的活动和纤维化情况<sup>(4)</sup>。我们检测了 57 例肝炎肝纤维化患者血清 HA，其水平升高者达 50 例，而且升高程度与肝纤维化的严重程度密切相关，与上述报道一致。经抗纤方治疗后，随着临床症状的显著改善，肝功能及血清 HA 等生化指标也显著改善，提示抗纤方对肝炎肝纤维化具有良好的治疗作用。笔者认为其作用是通过抑制了胶原合成；保护和改善了肝脏功能；并可能通过行气活血化瘀，促使肝内纤维组织软化，促进了胶原的分解。三者协同作用而达到治疗效果的。其确切机制有待进一步探讨。值得一提的是活血化瘀药物的运用要因人制宜。笔者体会剂量宜逐步加大至适当程度，这类患者本身精神负担重，情绪不佳，起始剂量过大往往加剧腹胀纳差等症状。从而加重精神负担，对治疗

不利。

国内有报道慢性肝炎及肝硬化 NAG 活性升高，可作为肝纤维化的辅助诊断<sup>(5)</sup>。但我们检测 57 例，升高者仅 3 例。此外，ADA、GST 以及 HYP 等水平大多数亦在正常范围，未见与肝纤维化相关性。

## 参 考 文 献

1. 蔡卫民, 等. 慢性肝病患者血清脲酶、甘胆酸和  $\beta_2$ -微球蛋白的变化及其意义. 中华消化杂志. 1990; 10(2): 81.
2. 蔡卫民, 等. 血吸虫病患者血清五项生化指标改变及临床意义. 浙江寄生虫病杂志. 1989; (4): 24.
3. Nyberg A, et al. Serum hyaluronate in primary biliary cirrhosis-A biochemical marker for progressive liver damage. Hepatology. 1988; 8(1): 142.
4. Horslev PK, et al. Serum amino-terminal type III procollagen peptide in rheumatoid arthritis. Relationship to disease activity, treatment, and development of joint erosions. Arthritis Rheum. 1986; 29: 592.
5. 陈道宏, 等. 肝硬化血清酶学诊断现状. 国外医学临床生物化学与检验学分册. 1989; 10(1): 20.

## 六神丸外用治疗带状疱疹 76 例

郑州矿务局总医院(郑州 452371) 周世杰 吕松芬

自 1989 年以来，我们运用六神丸外用法治疗带状疱疹 76 例，收效显著，报告如下。

**临床资料** 126 例患者，随机分为二组。治疗组 76 例，男 50 例，女 26 例；年龄 15~62 岁，平均 38.5 岁；病程 2~8 天，平均 3.7 天。丘疱疹型 34 例，水疱型 25 例，血疱型 13 例，溃烂渗出型 4 例。左胸背肩部 30 例，左腰臀部 17 例，右胸背肩部 20 例，右腰臀部 9 例。

对照组 50 例，男 37 例，女 13 例；年龄 16~56 岁，平均 36 岁；病程 3~10 天，平均 4.2 天。丘疱疹型 22 例，水疱型 19 例，血疱型 8 例，溃烂渗出型 1 例。左胸背肩部 18 例，左腰臀部 9 例，右胸背肩部 17 例，右腰臀部 6 例。患者均有局部疼痛及灼热感等自觉症状，经统计学处理，两组基本情况相近，有可比性。

**治疗方法** 取六神丸适量(视疱疹多少和皮损面积大小而定)，研成极细末，用食醋调成稀糊状即成。治疗组用药糊直接涂于患处，以能全部遮盖住疱疹和皮损为度，溃烂流水者，可用药末直接撒于患处，每日 3 次。1 周为 1 疗程，2 周无效者改用他法。

对照组采用聚肌胞注射液肌肉注射，每次 2 ml，隔日 1 次，外用氢化可的松软膏外擦局部，每日 3

次，坚持治疗 2 周。

**结 果** 疗效标准 痊愈：自觉症状消失，皮疹全部消退；显效：自觉症状消失，皮疹消退 85% 以上；好转：疼痛减轻，皮损消退 50% 以上；无效：症状、皮损无改善。

治疗组痊愈 68 例，显效 5 例，有效 2 例，无效 1 例，总有效率为 98.7%。对照组痊愈 26 例，显效 11 例，有效 7 例，无效 6 例，总有效率为 88.0%。经卡方检验， $X^2=5.06$ ， $P<0.05$ ，差异有非常显著性。

治疗组用药当日可见肿消、痛减，疱疹萎缩，2~3 天干枯结痂，4~8 天脱痂止痛，平均治愈 4.3 天。对照组 2~3 天肿消、痛减、疱疹萎缩，4~7 天干枯结痂，8~14 天脱痂止痛。平均治愈 6.2 天。

**体 会** 带状疱疹是由病毒感染引起的一种急性皮肤病。中医学认为本病多由肝旺火盛，脾湿久郁而致湿热蕴结，阻于经络，气血痹阻不通而成。治宜清热解毒，消肿止痛，凉血化瘀。六神丸中雄黄解毒杀虫，牛黄、冰片凉血消肿，蟾酥、麝香通络止痛，珍珠除湿收敛，调以食醋，活血消肿止痛，增强药物渗透作用，以充分发挥药效，药症相符，效果良好。