

例, 冬季型 17 例, 迁延型 8 例, 其他 2 例, 免疫检查 IgG 大于正常值 7 例, 低于正常值 1 例; C_3 低于正常 10 例。雷公藤组 38 例, 男 22 例, 女 16 例, 年龄 14~67 岁, 平均 34 岁; 病程 2 个月~27 年, 平均 5.8 年。点滴状和钱币状 36 例, 盘状及混合者各 1 例, 冬季型 26 例, 迁延型 11 例, 其他 1 例, 免疫学检查: IgG 大于正常值者 10 例, C_3 低于正常值 13 例。MTX 组 16 例, 男 11 例, 女 5 例; 年龄 15~67 岁, 平均 36 岁; 病程 3~20 年, 平均 6 年; 皮损全为点滴状和钱币状, 冬季型 9 例, 迁延型 7 例, 免疫学检查均属正常。

治疗方法 三藤二黄煎: 雷公藤(根去皮)、红藤、鸡血藤、黄芪、黄精各 20 g, 每日 1 剂, 水煎分二次服。风湿加乌蛇、防风; 挟湿加苍术、泽泻; 偏热加白茅根、生地; 燥甚加当归、天冬、麦冬; 兼瘀加红花、丹参、紫草。雷公藤组用雷公藤糖浆(本院制剂), 每日 30 ml(相当生药 30 g)分 2~3 次服, MTX 组用 MTX 5 mg/次, 隔 12 h 1 次, 每周连服 3 次。该两组均同服氨肽素, 1 g/次, 每日 3 次。三个组外用未作严格要求, 或用去炎松霜, 或牛皮癣膏, 或乐肤液, 随患者自便。疗程均为 1 个月。

结果 疗效标准 按照 1981 年 12 月卫生部编制的“疾病治疗效果评定标准”中银屑病的疗效标准: 临床治愈: 皮损全部消退或仅留少量不明显的点状损害; 好转: 皮损大部分或部分消退(50%以上); 无效: 治疗后皮损消退不足 30%或尚有新疹发生。结果: 三藤组治愈 13 例, 好转 11 例, 无效 3 例, 总有效率 88.9%。雷公藤组治愈 17 例, 好转 15 例, 无效 6 例, 总有效率 84.2%。MTX 组治愈 5 例, 好转 7 例, 无效 4 例, 总有效率 75%。三组经统计学处理, $P > 0.05$, 无显著性差异。但三藤组和雷公藤组见效比较快, 3 天瘙痒减轻或消失, 1 周内皮损基本消退。副作用: 雷公藤组最多见, MTX 组次之, 三藤组仅有胃不适、便秘各 1 例, 不影响继续治疗。随访 0.5~3 年, 三藤组停药 0.5 年复发 2 例, 停药 7~9 个月复发 3 例, 10~12 个月复发 5 例, 3 例未见复发。雷公藤组停药 5 个月复发 1 例, 6~8 个月复发 6 例, 9~11 个月复发 8 例, 2 例失去联系。MTX 组均在半年内复发。

体会 三藤二黄煎基于“治风先治血, 血行风自灭”的理论, 对于“血热”为因、“血瘀”为症的银屑病, 具有清热解毒、凉血活血、祛风止痒的临床效果, 见效时间明显缩短, 副作用少。

丙谷胺配合益气养阴活血中药 治疗胆石症 46 例

玉门石油管理局职工医院(甘肃 735200)

张西民 汪戈明

我们从 1990 年 2 月~1991 年 12 月, 应用丙谷胺配合中药治疗胆石症 46 例, 现总结如下。

一般资料 治疗组 46 例, 男 17 例, 女 29 例; 年龄 24~76 岁, 平均 54.7 岁; 病程 1~17 年, 平均 6.4 年。上腹疼痛 46 例, 放射痛 31 例。伴有胆囊炎 16 例, 慢性胃炎 4 例, 瘀胆型肝炎 9 例, 胃及十二指肠溃疡 11 例, 其他合并症 6 例。对照组 42 例, 男 18 例, 女 24 例; 年龄 28~68 岁, 平均 52.4 岁; 病程 3 个月~12 年, 平均 5.8 年。上腹疼痛 42 例, 放射痛 37 例。伴有胆囊炎 23 例, 胃及十二指肠溃疡 4 例, 瘀胆型肝炎 3 例, 慢性胃炎 6 例。

诊断标准 按 1979 年旅大会议制定的中西医结合胆道疾病诊疗标准[中级医刊 1980; (6): 56] 诊断。治疗组单纯胆囊结石 27 例, 肝总管及肝管内结石 7 例, 胆总管结石 4 例, 多发部位结石 8 例。对照组单纯胆囊结石 29 例, 肝总管及肝管内结石 8 例, 胆总管结石 3 例, 多发部位结石 2 例。

治疗方法 中药方: 黄芪 20 g 大黄 6 g 丹参 20 g 当归 10 g 丹皮 10 g 生山楂 20 g 鸡内金 10 g 沙参 20 g 佛手 10 g 大腹皮 10 g 金钱草 20 g; 每日 1 剂, 分 3 次服。治疗组服中药 1 h 后服丙谷胺与单独服丙谷胺组对照, 剂量均为丙谷胺 400 mg/次, 每日 3 次口服, 疗程均为 3 个月。

结果 疗效标准 治愈: 临床症状和体征消失, B 超检查结石全部排出, 随访 3 个月未复发; 显效: 症状和体征消失, B 超检查结石部分排出, 随访 3 个月未发; 有效: 症状和体征消失或减轻, B 超检查结石无改变, 随访 3 个月复发; 无效: 症状和体征无改变, B 超检查结石无变化。结果: 治疗组治愈 7 例, 显效 22 例, 有效 15 例, 无效 2 例, 总有效率 95.7%。对照组显效 9 例, 有效 16 例, 无效 17 例, 总有效率 59.52%。两组相比 $P < 0.001$, 具有显著差异。

体会 丙谷胺具有强烈的促胆汁分泌作用。配合某些益气养阴活血之中药, 能集消炎, 利胆, 增加胆汁分泌, 扩张胆管, 协调狄奥氏括约肌的功能等作用于一炉, 使胆汁“产”与“出”两旺, 有利于结石之溶解及排出。