

治疗70例,治疗组复常率为60%,对照组为16.7%。

重度黄疸及重症肝炎

一、实验研究 解放军302医院实验结果表明,慢活肝严重郁胆者血清维生素A水平低于正常,维生素C、E均高于正常人。

二、治疗 阳泉市第三人民医院用活血化瘀药加常规西药治疗15例,存活12例。沈阳市第二传染病院以古方茵陈、大黄、郁香、赤芍、桃仁、虎杖、秦艽、冬虫夏草等组方治疗重度黄疸,均取得较好疗效。

肝硬化

一、胆囊病变对肝硬化病情有影响 北京卫戍区医院报告肝硬化患者胆囊病变发生率高,且与肝功能损害有关。

二、肝硬化的治疗 长春市中医院以生地、知母、柴胡、元参、蒲公英、板蓝根等组方治疗肝硬化疗效较好。解放军302医院用软肝片(虫草、赤芍、三七、鳖甲等)治疗60例,肝脏缩小率为66.7%。

三、肝硬化腹水的治疗 浙江医科大学用消臌汤,大庆市第二医院用速尿穴位注射疗效均较好。四川攀枝花市攀钢职工医院用培补动力法(益气活血养

阴),辅以心得安、利尿剂治疗44例取得较好疗效。

四、肝硬化消化道出血 解放军302医院对83例肝硬化上消化道出血的并发症进行了分析。全部病例均发生了并发症,其中26例死于出血后并发症。并对消化道出血患者采用通下法治疗8例,无1例死于致死性并发症。

丙型肝炎

一、检测技术

解放军302医院报告应用PCR技术在丙型肝炎患者外周血单核细胞中检出HCV-RNA,与丙型肝炎关系有待进一步研究。

二、重叠感染 青岛市传染病院对各型肝炎检测抗-HCV,其中甲肝抗-HCV阳性率4%,乙肝为9.2%,而非甲非乙型肝炎中的阳性率为76.2%。大连市传染病院对61例住院患者检测HCV及HBVM, HCV与HBV重叠感染31例。

三、丙型肝炎病理报告 空军南京医院报告丙型肝炎患者有病理改变。发现肝细胞脂肪变性及纤维化趋势非常明显。

(贺江平 王惠吉 汪承柏整理)

苓桂术甘汤治疗虚寒型秋季腹泻30例

江西新余钢铁厂第一职工医院(江西 336501) 罗 谦

60例秋季腹泻患者随机分为两组进行治疗,其中苓桂术甘汤治疗组疗效显著,报告如下。

临床资料 选择1986年11月16日~12月20日发病的60例病例。随机分为苓桂术甘汤治疗组30例,对照组30例。临床表现:大便蛋花水样或挟有少量粘液,无腥臭味,肛周不红;镜检白细胞不超过4个/高倍视野;粪便培养无细胞生长。60例中,男38例,女22例,年龄2个月~2岁3个月。88%的病例年龄在5个月至1.5岁。呈明显流行性。治疗组与对照组病情分别为:发热者24、27例,体温多在37.0~38.5℃;腹泻者每天10余次者为25、23例,每天7~8次者5、7例;呕吐者17、21例;有呼吸道症状者18、18例;脱水者26、29例。两组病例中医辨证均为虚寒型,一般情况及病情比较无显著差异。

治疗方法 治疗组处方:茯苓9g 炒白术5g 桂枝3g 甘草2g 肉桂1~2g 车前子3g 泽泻4g 神曲3g;呕吐者加制半夏4g。每天1剂,分2~3次口服。对照组:庆大霉素2000~3000u/kg,

每天2次。氨苄青霉素50mg/kg,每天2次;氟哌酸5mg/kg,每天3次;胃蛋白酶合剂2~5ml/次,每天3次。其他治疗措施:如禁食、补液及对症处理两组病例相同。3天为1个疗程。

结果 疗效标准痊愈:治疗6天,腹泻、发热、呕吐及上呼吸道症状消失,脱水纠正。无效:治疗6天以上,病情无好转改用其他治疗方法。

治疗组痊愈,平均泻止天数2.2天,治愈率100%。对照组痊愈26例,平均泻止天数4.4天,治愈率86.7%。两组病例的疗效(72h内泻止为特效)比较经统计学处理差异有高度显著性($P<0.01$)。平均泻止天数差异非常显著($P<0.01$)。

体会 本方以茯苓淡渗以利水湿,桂枝、肉桂宣阳活跃微循环,白术健脾,甘草和中,组成补土制水之剂。神曲含多种消化酶,车前子、泽泻利尿以达止泻目的。通过以上诸药作用,起到活跃微循环,促进肠道对水份的吸收,恢复其消化吸收之功能,达到止泻的目的。