

应，有利于推动输尿管结石下移，促进结石排出。王不留行、大黄活血化瘀通淋。牛膝能补肾引诸药下行。现代药理研究证明：牛膝能增加输尿管平滑肌的收缩能力，消除因结石刺激而形成的瘢痕。芒硝能化七十二种石。硼砂其性能柔五金而去垢腻。琥珀粉消瘀血通五淋。海金沙、车前子通淋利尿。鸡内金有明显的磨石化石健脾的功用。甘草调和诸药。诸药合用，切中病机，全方共奏消炎利水、化石软坚解痉的作用。

复方丹参片治疗阻塞性输卵管炎 30 例

江苏省邳州市中医院(江苏 221300)

王金陵 于久权

近 3 年来笔者试用复方丹参片治疗阻塞性输卵管炎 30 例，取得满意效果，现报告如下。

临床资料 本组 30 例均为生育期年龄，最小 24 岁，最大 36 岁。病程最短 18 个月，最长 7 年余。全部病例在治疗前曾采用中西药治疗(中药口服、灌肠、热敷，西药应用多种抗生素、胎盘组织液、糜蛋白酶及宫腔内注射等)数月至数年均无明显疗效。30 例均经子宫输卵管通畅试验和 B 超检查，其中 16 例行子宫输卵管碘油造影，均证实为典型的阻塞性输卵管炎。临床特点：本组患者均为继发性不孕症，曾有人工流产或自然流产史。都伴有不同程度的下腹痛，月经前或劳累后加重(4 例呈绞痛曾误诊为输尿管结石)。其中并发月经不调者 18 例，宫颈糜烂、白带增多者 15 例，慢性盆腔炎者 13 例，盆腔两侧可触及条索状输卵管者 18 例，可扪及包块者 12 例，双侧输卵管积水者 12 例，一侧积水对侧粘连者 8 例。

治疗方法 30 例均采用自身对照，治疗期间停用其它药物。口服复方丹参片(江苏省连云港中药厂生产)1 日 3 次，1 次 3 片，月经期停用。

结果 疗效标准 治愈：腹痛消失，月经正常，B 超检查输卵管积水完全消失，子宫输卵管通畅试验证实畅通或妊娠；有效：腹痛消失，输卵管积水基本吸收，由不通到部分通畅；无效：连续服药 6 个周期病情无变化。结果：治愈 10 例(其中 3 例妊娠)，有效 13 例，无效 7 例。除 3 例妊娠者服药 3~4 个周期，其余病例均连续服药 6 个周期。总有效率 76.7%。

讨论 阻塞性输卵管炎多因流产或产后细菌感染引起的输卵管内膜感染，迁延日久治疗不彻底所致。其病理改变为输卵管腔阻塞，管壁增厚变硬，常

与周围组织粘连。中医学对该病的辨证多为瘀、滞。治疗以化瘀通络、抗菌消炎为主。复方丹参片由丹参、三七、冰片组成。能活血祛瘀，凉血消肿，通络镇痛，抗菌消炎，故治疗阻塞性输卵管炎疗效较好。

丹参注射液治疗瘢痕疙瘩 12 例

武汉大学医院(武汉 430072) 杨 卫

笔者自 1987 年以来，使用丹参注射液以局部封闭法和涂擦法治疗各种原因形成的瘢痕疙瘩 12 例，疗效满意。

临床资料 本组 12 例，男 1 例，女 11 例，年龄 20~60 岁，平均 44.8 岁。病程 3 个月~31 年，平均 5.4 年。其中术后形成瘢痕疙瘩 6 例，因长疖，疖逐渐形成瘢痕疙瘩 5 例，针灸感染引起瘢痕疙瘩 1 例。皮损面积 $0.5 \times 0.5 \sim 18 \times (0.5 \sim 3) \text{ cm}$ ，平均 $7.5 \times 2.1 \text{ cm}$ 。瘢痕疙瘩形成后逐渐隆起，颜色变红，似新生的肉芽组织，质地较硬，奇痒难忍，常被患者抓破出血继而向正常皮肤扩散、延长，与正常皮肤界限分明。因感染和长疖，疖形成的瘢痕形状不规则，术后形成的瘢痕沿切口增宽、增厚。症状呈日益加重。

治疗方法 (1) 局封法(8 例)：用丹参液注射(上海第一制药厂生产，每 ml 含生药 1 g；亦可用复方丹参注射液)在皮损四周轮流交替注射，针刺方向斜向皮损下肌肉层，根据皮损情况，每次取 2~4 个部位，每部位用药 0.5~1 ml，10 天为 1 个疗程，每疗程间隔 2~3 天。(2) 涂擦法(4 例)：用同种药液涂擦患处，每日 2~4 次，每日用药总量为 2~6 ml，无需休息。以上两法治疗到皮损颜色转为正常肤色或正常瘢痕色，质地平软，奇痒消失为止。治疗时间最短 6 天，最长 0.5 年。

结果 疗效判定标准 痊愈：皮损 100% 转为正常肤色或正常瘢痕色，质地平软，奇痒消失，随访二年未复发。显效：约 80% 的皮损色转正常，质地平软，奇痒消失，偶有瘙痒时，再治疗仍有效。好转：约 50% 的皮损色转正常，质地平软，奇痒消失，瘙痒时再治疗仍有效。无效：经治疗，诸症未好转。结果：痊愈 6 例，显效 3 例，好转 2 例，无效 1 例，总有效率为 91.7%。

体会 瘢痕疙瘩系结缔组织增生性疾病，临幊上不少见，因奇痒难忍，向四周扩散，给患者带来不少痛苦。笔者采用上述治疗方法取得满意疗效，这与丹参有抑制成纤维细胞生长和增生的作用有关。本法简便，无毒副作用，易被患者接受，值得推广。