

## · 农村基层园地 ·

# 麝香丹灸治腰椎间盘突出症 332 例临床观察

解放军第 208 医院(长春 130062)

张海发 王孜优 刘伟中\* 陈伟

曹铁 孙柏龄 周美生\*\*

我院自 1985 年 9 月~1990 年 9 月,进行了麝香丹灸治腰椎间盘突出症 332 例临床观察,取得一定疗效。现报告如下。

**临床资料** 本组病例全部为住院患者,男 265 例,女 67 例,共 332 例。平均年龄 39.2 岁,平均病程 166 天,平均住院天数 32.3 天。全部病例均按《临床疾病诊断依据治愈好转标准》(杨鼎成,等,1983:544)中“腰椎间盘突出症”的标准进行诊断。

**治疗方法** 处方组成:由麝香、硫磺、朱砂、雄黄组成。将硫磺置入铜锅内,用文火熔化,放入其余诸药,迅速搅拌均匀,倒入模具中,用凉水冷却成型,每粒 250 mg。选穴方法:每次治疗均需取腰部患病椎间隙水平之督脉、夹脊穴及足太阳膀胱经上的深部压痛最敏感点处为主穴,取患侧臂上皮神经及下肢足太阳膀胱经、足少阳胆经上的深部压痛最敏感点处为配穴。每次治疗取 3 个穴位。灸治方法:灸治时取治疗穴位朝上体位,揭去丹灸垫上的蜡纸,将丹灸垫帖于所选穴位上,将麝香丹 1 粒置于垫上,用火柴点燃药,用拨火棒将熔化的药液拨平在丝网上,频频搅动药液,以助燃烧,待药液燃净后去掉丹灸垫。疗程疗次:每周灸 3 次,2 周为 1 疗程。丹灸禁忌症:(1)破裂型腰椎间盘突出症。(2)中央型腰椎间盘突出症。(3)间盘纤维环伴有钙化及骨赘者。(4)合并有椎管狭窄症者。

**治疗结果** 疗效标准:根据胡有谷主编腰椎间盘突出症标准(北京:人民卫生出版社,1985:220)。治愈:症状完全消失或接近消失,直腿抬高试验可达 85 度左右,能恢复原工作;显著进步(即显效):症状大部分消失,直腿抬高试验超过 70 度,可恢复工作;好转:症状部分消失,直腿抬高较治疗前显著改善,可担任较轻工作;无效:症状无明显减轻,不能参加工作。治疗结果:(1)近期疗效:治愈 242 例(72.89%),显效 29 例,好转 57 例,无效 4 例,总有效率 98.80%,近期平均治愈天数 26.5 天。(2)远期疗效:随机随访出院 0.5~5 年的患者 107 例,治愈 92 例(85.98%),显效 8 例,好转 4 例,无效 3 例,总有效率 97.20%。其中,出院时判为近期治愈

者 85 例中,复发 4 例。远期疗效治愈率高于近期治愈率,经统计学处理差异非常显著( $P < 0.01$ )。实验室检查 (1)凝血机制指标:治疗前后检验血小板粘附率 47 例,优球蛋白 35 例,经统计学处理差异非常显著( $P < 0.01$ );凝血酶原时间 48 例,差异显著( $P < 0.05$ )。(2)扫描电镜观察血小板形态:治疗组 21 例,丹灸治疗前,血小板凝聚成较大的团块状,形态明显变异,外形不整齐,边缘不光滑,有的伪足消失变圆。丹灸治疗后,血小板呈分散状态,与正常人的血小板相比,其形态基本相似,边缘光滑,伸出较多的伪足。健康组 10 名,血小板形态均正常,在玻片上呈分散状态,血小板边缘光滑,伪足多。

**讨论** 选用麝香丹灸,取其药物芳香走窜力强和温热通阳散寒,共奏疏通经络、活血散瘀功效,进而使经络阻滞得通,通则痛消。通过治疗前后电镜扫描观察血小板形态和凝血机制指标检测证实:该疗法有对血小板解聚和降低粘附作用,有对血管、血液活化加强作用。血液循环的改善,可以增强腰椎病变局部的新陈代谢,减轻致痛物质的作用,从而消除神经根充血、水肿、炎症反应,进而达到消炎止痛目的。腰椎间盘突出症属于中医腰痹范畴,多系腰部外伤,腰及下肢出现经络瘀滞现象而致病。临床多以血瘀证表现为主,故治以活血通络、化瘀止痛,疗效较为满意。

## 脉络宁治疗急性缺血性脑血管病疗效观察

石家庄地区人民医院(石家庄 050051)

王敬先 申艳秋 赵丽敏 张素娥

我院自 1987 年 1 月~1990 年 12 月用脉络宁注射液治疗急性缺血性脑血管病 130 例患者,并与同期胞二磷胆碱治疗组 77 例对照,取得较好疗效。现报道如下。

### 资料与方法

**一、病例选择** 本组共 207 例,均为我院住院或门诊患者,全部患者均符合 1986 年中华医学会第二次全国脑血管病学术会议第三次修订诊断标准(中华神经精神科杂志 1988;21(1):60)。用药前均经头颅 CT 检查证实为脑血栓或脑梗塞,所有患者无血小板及凝血障碍性疾病。其中男 182 例,女 25 例;年龄 41~83 岁,分为两组。脉络宁治疗组 130 例,男 118 例,女 12 例;年龄 41~83 岁,平均 62.5 岁;其中脑血栓 45 例,脑梗塞 85 例;病程最短 20 h,最长 3 日。胞二磷胆碱对照组 77 例,男 64 例,女 13 例;年龄 42~80 岁,平均 61 岁;其中脑血栓 29 例,脑梗塞 48 例;病程最短 16 h,最长 4 日。两组年龄和性别经统计学处理无显著差异。

**二、治疗方法** 治疗组给予脉络宁注射液[南京

\* 吉林省公安厅科研所; \*\* 广西桂林地区医院中医科