

食有不同程度的关节炎急性发作，复经上方治疗缓解，但至今不敢进高嘌呤饮食。

讨论

用药针对该病湿热瘀毒，方以二妙散加味。药物精炼，组方合理，在一定程度上改善体内 pH 值。加快嘌呤代谢，抑制尿酸合成，促使血尿酸从小便排出。沉积于体内关节、组织等处的血尿酸含量减少，红肿疼痛诸证随之缓解。在治疗过程中，对伴发尿酸结石者，该药改变了尿液环境，使得在酸性尿中形成的结石处于碱性环境中紧固性逐渐消失，容易松解，成小块状排出。如其中 3 例肾盂结石，均为 1.8 cm 以上，治疗中或疗程结束后 1 周内先后各排出 4~7 粒黄豆大结石。

松香在临床的应用

洛阳市第二中医院(河南 470003)

许显武 许建欣

松香为松脂炼制而成，药源充足，价格低廉，用途广泛，实为临床之良药。余积 40 余年之临床经验，主用松香治疗烧伤、急性蜂窝织炎、慢性浅表性胃炎等病，均取得了显著疗效。现报道 3 例如下。

一、烧伤

王某某，女，60 岁，农民。患者于 1991 年 6 月 3 日不慎用开水烫伤双下肢膝下至足踝部，其中深浅 II° 烧伤面积占全身 20%，局部红肿，水疱，剧痛难忍，急送我院就诊。

处理：常规消毒疮面，刺破水疱，以经验方松及油涂抹患处。处方：松香 60 g 白及 50 g 五倍子 50 g 梅片 15 g 紫草 20 g，取麻油 500 ml 炸五倍子、白及、紫草 30 min，过滤去渣，后入松香、梅片，浓缩至 300 ml，用毛笔将药涂于患处，疼痛立止，每日 3~4 次，保持疮面湿润，7 日痊愈出院。

二、急性蜂窝织炎

李某某，女，15 岁，学生。患者颈部右侧乳突下肿痛 5 天，伴畏寒发热口干，便秘，在外院诊断为“急性蜂窝织炎”。肌肉注射青、链霉素 4 天，肿痛蔓延至右下颌关节下方，被动员切开引流。家属恐影响容貌，遂于 1989 年 8 月 10 日转至我院要求中医治疗。查体温 38.2℃，白细胞 16000/mm³，中性 80%，淋巴 20%，乳突下肿块约 8×9 cm，质硬，触之无波动感。处方：松香 40 g 白及 30 g 朱砂 12 g 梅片 12 g 白芷 12 g，上药共为细末，醋调外敷患处，间日换药 1 次，6 日肿痛消失而愈。

三、慢性浅表性胃炎

郭某某，男，36 岁，某部通讯营干部。患者上腹部隐痛，腹胀 3 年，加重 3 个月。近年来因长途跋涉，饮食失节，致使上腹部间断性隐痛，胃中灼热，腹胀，恶心，泛酸，时有呃逆，食欲不振。虽经中西医屡次治疗久不取效。1991 年 11 月 4 日来院求治。

查舌质红，苔厚腻，脉滑有力。胃镜提示：慢性浅表性胃炎。处方：松香 10 g(后下) 白及 18 g 五倍子 10 g 枳壳 10 g 木香 6 g 大黄 6 g 二丑 6 g 黄连 2 g 甘草 9 g，共 5 剂，每日 1 剂水煎服。1991 年 11 月 12 日复诊，胃脘疼痛缓解，胃中灼热、腹胀、呃逆均减轻，食欲增加，舌苔已退。宗上方 7 剂，共为细末，每日 2 次，每次 9 g 冲服，月余诸症消失而愈。

黄连素片治疗室性早搏 65 例疗效观察

郑州市第四人民医院(郑州 45000) 苏思仁

郑州市中医院 张恩芝 刘贺玉

室性早搏是临床上常见的心律失常。自 1990 年 1 月~1992 年 9 月，我们使用黄连素片对 65 例室性早搏患者进行了治疗，取得了较为满意的疗效。现报道如下。

临床资料

本组 65 例，全部为住院患者。男 50 例，女 15 例。年龄最小者 22 岁，最大者 75 岁，平均年龄 49 岁。其中冠心病 31 例，高血压心脏病 20 例，甲亢性心脏病 5 例，风湿性心脏瓣膜病 5 例，充血性心肌病 4 例。病程最短者 3 个月，最长者 22 年，平均 3.5 年。其中 3 个月~1 年者 35 例，1~2 年者 15 例，2~5 年者 10 例，5 年以上者 5 例。

治疗方法

本组患者，入院后先行血、尿、粪常规检查及肝、肾功能及 X 线胸片检查。高血压患者使用不影响心律的降压药物，使血压维持在满意的水平(18~16/12~14 kPa)。心脏功能不全者，使用纠正心脏功能药物，使心脏功能改善至 1~2 级。甲亢则使用药物控制甲状腺功能，使心率低于 110 次/min。冠心病患者，使用扩张冠状动脉的药物，使心肌缺血得到改善。经过上述对症治疗以后，仍有室性早搏持续存在者，选为使用黄连素片治疗的对象。此时停用一切影响心律的药物 1 周，做 24 h 连续心电图记录后开始用药：黄连素 0.4 g，每日 3~4 次口服，每个疗程为 10 天。第一疗程结束后，复查血、尿、粪常规及肝、肾功能，重复描记 24 h 心电图记录，对有效和显效者继续使用原剂量 1 个月，然后酌情减量维持，无效者可停药。

结果

疗效判定：室性早搏数量减少 75% 以上者为显效，减少 50~75% 者为有效，减少不足 50% 者为无效。结果：各种合并室性早搏的心脏病黄连素片疗效见附表。