

附表 65例合并室性早搏的疾病疗效比较 [例(%)]

病种	例数	显效	有效	无效	总有效
冠心病	31	19(61.3)	6(19.4)	6(19.4)	25(80.6)
高血压心脏病	20	9(45.0)	3(15.0)	8(40.0)	12(60.0)
风湿性心脏瓣膜病	5	1(20.0)	1(20.0)	3(60.0)	2(40.0)
甲亢性心脏病	5	2(40.0)	2(40.0)	1(20.0)	4(80.0)
充血性心肌病	4	0	1(25.0)	3(75.0)	1(25.0)
合计	65	31(47.7)	13(20.0)	21(32.3)	44(67.7)

讨 论

黄连素片作为抗心律失常药物应用于临床,为其新用途。近年来对黄连素的主要成份异喹啉类生物碱进行了药理和电生理研究,指出该生物碱使心肌蒲肯野纤维延迟激活钾离子流,阻断钾离子流通道,抑制潜在起搏点冲动发放及不完全复极的存在,降低心肌细胞的自律性,延长有效不应期,使心肌细胞复极更为均匀一致,延长心肌细胞动作电位时程,从而发挥抗心律失常作用。此外,积极治疗心律失常的原发病和改善心脏功能是提高黄连素疗效的重要因素。

中西医结合治疗带状疱疹 320 例观察

山东省临沂市白沙埠中医诊所(山东 276035)

张庆好 张更生

近年来,笔者应用中西医结合的方法治疗带状疱疹,疗效满意。现将临床资料比较完整的 320 例报告如下。

临床资料 本组 320 例均按《实用中医外科学》(尚德俊,第1版,济南:山东科学技术出版社,1986:516)进行确诊。其中,男 198 例,女 122 例;10 岁 4 例,18~40 岁 185 例,41~60 岁 85 例,61~75 岁 46 例;疱疹发生于头颈部 27 例,胸部 169 例,背部 68 例,腰腹部 34 例,上肢 12 例,下肢 10 例。分布特点以肋间神经分布区居多,三叉神经分布区次之。病程最短者 3 天,最长者 13 天。

治疗方法

一、西医治疗 采用 2%利多卡因,加维生素 B₁₂在皮损处做皮下局部封闭,封闭剂量按皮损面积大小而定,每日 1 次。目的是减轻疼痛,防止病灶蔓延。

二、中医治疗采用自拟青紫方 (1)方药组成:青黛 10g 紫草 10g 炉甘石粉 10g 炒王不留行 10g 冰片 2g 米醋 100 ml。(2)用法:将紫草、

王不留行、冰片共研细末,与青黛、炉甘石粉拌匀,装于瓶中,加米醋调成稀糊状,密闭备用。常规消毒皮损部位,按皮损面积大小,将药平摊于纱布上约 0.2 cm 厚,贴敷患处,用胶布或绷带固定,每日换药 1 次。

结 果 带状疱疹及伴随症状消失,皮损全部结痂或结痂完全脱落为痊愈;带状疱疹及伴随症状减轻,皮损部分结痂或结痂部分脱落为好转;带状疱疹及伴随症状较治疗前未见改善或继续加重为无效。结果:320 例全部治愈。治疗次数最多 4 次,最少 2 次,平均 3 次。一般用药 24 h 症状明显好转;治疗 1 次,疼痛显著减轻,水疱开始萎缩,2 次后水疱干涸结痂,自觉症状消失。

体 会 带状疱疹是由疱疹病毒引起的急性疱疹性皮肤病,以成年人多见,单纯西药治疗欠佳,尤其是年老患者往往遗留疱疹消退后神经痛。我们通过临床观察,采用中西医结合的方法治疗本病,具有见效快、疗程短、治愈率高、无后遗症等特点。笔者认为,本病主要是心肝火热,肺脾湿热内结,复感时令毒邪,相搏于肌肤,阻于经络,气血不通而致。治宜清热解毒,祛湿生肌,活血止痛。方中青黛、紫草清热泻火解毒、凉血散肿,据现代医学研究,青黛、紫草都有抑制某些细菌和病毒的作用;炉甘石、冰片祛湿生肌、消肿止痛;王不留行善走血分,行而不住,走而不守、活血消肿止痛;诸药合用共奏清热解毒、祛湿生肌、活血止痛之功。

中药夏季皮炎洗方治疗多形性日光疹 20 例

天津西青医院(天津 300380) 郝文瑞

夏季皮炎洗方是用来治疗多形性日光疹的一种外洗中药。通过洗浴病变部位以达到治疗目的。经临床实践,疗效尚为满意。现将 20 例患者的治疗观察结果介绍如下。

临床资料 20 例中男性 5 例,女性 15 例;年龄:最小者 16 岁,最大者 80 岁,20~40 岁之间的有 18 例;病程:3 个月以下的有 18 例,3 个月以上的有 2 例,占 10%。

治疗方法 本组 20 例患者全部采用夏季皮炎洗方外洗患处,并酌情配以外用药物治疗。夏季皮炎洗方组成:银花 30g 蒲公英 15g 防风 12g 牛蒡子 15g 薄荷 6g 白鲜皮 15g 地肤子 15g 苦参 10g 紫草 15g 丹皮 10g 生甘草 6g。伴红肿热