

反射的影响. 生理学报 1987; 39: 282.

5. Chey W. Y, et al. Effect of secretin on motor activity of stomach and Heidenhain pouch in dogs. Am J physiol

1969: 848.

6. 周 吕, 等. 针刺“人中”穴对胃运动效应的影响及其与外周 5-羟色胺变化的关系. 针刺研究 1987; 12: 130.

中西医结合治疗小细胞肺癌观察

上海第二医科大学附属第九人民医院胸外科(上海 200011)

倪 锋 王相才 方立德 蒋惠人

本文报道我院自 1982 年 5 月~1990 年 5 月手术切除肺加中医扶正培本治疗小细胞肺癌 20 例与单纯手术切除小细胞肺癌 17 例的疗效分析。

资料与方法

一、资料 全组共 37 例, 男 32 例, 女 5 例。年龄 42~75 岁, 平均 61 岁, 其中 60 岁以上 28 例。根据国际抗癌联盟 TNM 分期(1978 年)I 期 10 例, II 期 15 例, III 期 12 例。肺叶切除 32 例, 全肺切除 5 例, 无手术早期死亡。全组随机分为中西医结合治疗组(中西组)20 例, 单纯手术切除肺组(手术组)17 例。

二、方法 中西组治疗采用手术切除肺加扶正培本中药结合治疗。通常术后第 2 天开始应用中医益气、补血为主, 佐以清热解毒为辅方剂治疗, 每日 1 剂, 连续服用 1 个月; 后改为以滋阴温阳、补气和补血为主, 佐以清热解毒和软坚化痰为辅方剂治疗。每日 1 剂, 连服 2 个月; 最后以清热解毒软坚化痰为主, 辅以补气、补血和温阳中药继续治疗 1 年。中药基本方: 南北沙参 30 g 天门冬 9 g 生地 12 g 鲜茅茎 15 g 党参 20 g 人参 20 g 茯苓 20 g 白术 12 g 仙灵脾 20 g 补骨脂 20 g 桃仁 12 g 夏枯草 30 g 白花蛇舌草 30 g。1 年后改用隔周服用汤剂: 补肾健脾、活血化瘀药: 巴戟天 15 g, 薏仁 20 g

茯苓 20 g 炙甘草 9 g 牛膝 12 g 川芎 15 g 丹参 20 g。隔周口服中成药牛黄醒消丸、刺五加片和六味地黄丸等。3 年后停用汤剂, 改用上述中成药口服。

结 果

中西组平均生存时间为 38.3 个月; 手术组为 7.8 个月, 两组有显著性差异($P < 0.05$)。

中西组 1、3、5 年生存率分别为 95%、45%、25%; 手术组 1、3、5 年生存率分别为 17.6%、5.9%、5.9%。两组 1、3 年生存率有非常显著性差异($P < 0.01$), 中西组明显优于手术组。两组 5 年生存率尚无显著性差异。

讨 论

中医扶正培本法治疗小细胞肺癌, 是用扶持正气、培植本元的方法调节人体阴阳气血、脏腑经络生理功能。肺癌患者本虚而邪实。手术切除了病肺, 祛除了局部实邪, 而机体仍表现为虚。应用扶正培本法治疗, 既能扶持正气, 又能培植本元, 从而调节人体免疫功能, 提高患者抗癌能力, 更加有利于调整手术创伤对人体所造成的生理功能紊乱。小细胞肺癌恶性程度高, 而中西医结合治疗 1、3、5 年生存率明显提高, 平均生存时间为 38.3 个月。临床结果表明, 中西医结合治疗小细胞肺癌是有效的治疗方案之一。

欢迎订阅本刊 1994 年增刊

为了扩大学术交流, 提高临床研究水平, 应广大读者的要求, 并经上级有关部门批准, 《中国中西医结合杂志 1994 年增刊》即将与广大读者见面。本增刊附有英文摘要, 共约 60 万字。本增刊以临床为主, 选题广泛, 内容丰富, 学术水平较高, 科学性较强, 集中反映了我国中西医结合临床研究领域近年来的最新进展。本增刊将于 1994 年上半年出版, 每册定价 25.00 元(另加邮费 2.50 元), 可直接由邮局或银行向本社预订。本社地址: 北京西苑中国中西医结合杂志社(邮政编码: 100091)。开户银行: 北京工商银行海淀区办事处, 帐号: 461098-45。务请写清收刊者详细地址、姓名及所在地邮政编码, 注明“购 1994 年增刊”。

中国中西医结合杂志社