

4. Parnley WW, et al. Silent myocardial ischemic coronary artery disease. A commemorative symposium. San Francisco, California, 1988; 15: 17.
5. Pepine CJ. Silent myocardial ischemia. Cardiology Clinics. Vol 4. London: Saunders Company, 1986: 577-581.
6. Stem S, et al. Clinical out come of silent myoeardial ischemia. Am J Cardiol 1988; 61: 16.
7. Deanfield JE, et al. Variability of "stable angina" revealed by ST Holter monitoring implications for clinical investigation (abster). Circulation 1986; 74: 40.
8. Strauss HC, et al. Electrophysiological properties of the rabbit sinotrial pennodal fibers. Circ Res 1972; 31: 490.
9. 苏雅, 等. 三七绒根提取物对心血管作用. 药理学报 1979; 14(6): 321.
10. 范世藩, 等. 丹参对急性缺血心肌间盘损伤的作用. 药理学报 1979; 14(7): 416.

58 例早期流产后恶露不绝治疗小结

山东中医学院附属医院(济南 250011) 刘瑞芬

山东省计划生育科研所 梁翠兰

近几年来, 我们采用自拟宫复汤治疗早期流产后恶露不绝 58 例, 疗效较好, 并与对照组 26 例进行了比较, 现报告如下。

临床资料 本组 84 例患者均为门诊病例, 随机分为两组。服宫复汤者 58 例(简称治疗组), 年龄 21~45 岁, 平均 29.5 岁。阴道流血时间最短 10 天, 最长 81 天, 其中 10~20 天 18 例, 21~30 天 23 例, 31~40 天 10 例, 40 天以上 7 例, 平均 28 天。流产方式: 早期人工流产 46 例, 自然流产 12 例(清宫者 8 例)。对照组 26 例, 以上各项数据(含比例数)与治疗组基本一致, 具有可比性。

治疗方法 (1)治疗组: 口服宫复汤, 每日 1 剂, 分 2 次服。5 剂为 1 疗程, 最多用 2 个疗程。基本方: 党参 18g 益母草 30g 马齿苋 30g 贯众炭 30g 黄芩炭 9g 银花炭 18g 地榆 30g 炒蒲黄 9g 茜草炭 15g 乌贼骨 30g 芥穗炭 6g 水煎服。随证加减: 兼发热、腹痛拒按, 恶露臭秽者, 上方去党参, 加连翘 12g、黄柏 9g; 兼小腹时痛, 恶露有块, 块下痛减者, 加三七粉 3g(冲); 兼小腹冷痛, 喜热熨者, 加炮姜 6g; 兼神疲肢倦, 纳差者, 党参改为 30g, 加黄芪 30g、炒白术 12g、炒谷、稻芽各 12g; 兼头晕、心悸、面色萎黄者加炒归身 9g、枸杞子 12g、白芍 9g。(2)对照组: 口服土霉素每次 0.5g, 每日 4 次, 或螺旋霉素每次 0.3g, 每日 3 次, 疗程 7 天; 同时口服益母草膏每次 10ml, 每日 3 次, 疗程 10 天。

结 果

一、疗效标准 (1)痊愈: 药后恶露净止, 症状

消失。(2)好转: 药后恶露减少, 症状减轻。(3)无效: 药后恶露无变化, 甚至增多, 症状无改善。

二、结果 治疗组与对照组痊愈者分别为 49 例、15 例, 好转者分别为 6 例、1 例, 无效者分别为 3 例、10 例, 总有效率分别为 95%、62%, 两组总有效率比较(χ^2 检验)有显著性差异($P < 0.01$), 宫复汤疗效明显优于对照组。治疗组与对照组痊愈患者, 平均疗程分别为 5.5 ± 1.5 天、 8.0 ± 2.0 天, 两组比较(t 检验)有显著性差异($P < 0.01$), 治疗组痊愈患者平均疗程较对照组明显缩短。

讨 论 早期流产后恶露不绝属中医学“恶露不绝”范畴。基于产后多虚多瘀的特点, 中医对恶露不绝的治疗, 多采用补血行瘀之法治疗。笔者认为, 早期流产后胞络损伤, “多虚”是以气虚为主, 又因流产后多有瘀血阻滞, 以致新血不得归经, 且瘀久又易化热, 加之宫腔手术操作, 外邪易乘虚上客, 外邪与瘀热相搏, 热伤血络致本病发生。本病临床以虚实夹杂证为多见, 气虚、血瘀、瘀热是其病机实质, 故我们治以益气、化瘀、清热法。方中党参健脾益气, 以资生化之源, 并能统血; 马齿苋、贯众炭、黄芩炭、银花炭、地榆清热止血; 益母草、茜草炭、炒蒲黄祛瘀止血; 乌贼骨固涩止血不留瘀; 芥穗炭引血归经。全方标本兼顾, 塞流与澄源并用, 故起到了较好的效果。

治疗时须注意以下两点: (1)方中党参、益母草、马齿苋、贯众炭、黄芩炭是本方的主药, 必用。益母草、马齿苋、贯众炭三味量必须大, 一般要用 30g。(2)本方对宫腔残留组织较多或宫腔残留组织有粘连者疗效不佳, 其中治疗组 3 个无效病例均属此类。